

**በከተማ ጤና ኤክስቴንዥን ፕሮግራም  
□ እናቶችና ህፃናት ጤና አጠባበቅ  
ፓኬጅ**

**በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር**

**ነሐሴ 2001 ዓ.ም  
አዲስ አበባ**

# ማውጫ

## ገጽ

1. መብረጃ.....	1
2. ጥላማ .....	2
2.1. አጠቃላይ ዓላማ .....	2
2.2. ዝርዝር ዓላማዎች .....	2
3. የማስፈጸሚያ ስልቶች .....	3
4. የሚከናወኑ ዝርዝር ተግባራት፣ .....	4
□□ል 1:-□እናቶች ጤና አጠባበቅ.....	6
1. ትኩረት ያለው የቅድመ ወሊድ አገልግሎት.....	6
1.1. በእርግዝና ወቅት የሚታዩ አደገኛ ምልክቶችና ትኩረት የሚያስፈልጋቸው ሁኔታዎች.....	8
1.2. በእርግዝና ጊዜ የሚደረጉ ጥንቃቄዎች .....	10
1.3 ከእናት ወደ ልጅ የሚተላለፈውን ኤችአይ ቪ ለመከላከል የምክክርና የደም ምርመራ አገልግሎት .....	12
2. የማዋለድ አገልግሎት.....	14
2.1 በወሊድ ጊዜ መደረግ የሚገባቸው ጥንቃቄዎች.....	14
2.2 ሕፃኑ እንደተወለደ የሚሰጡ መሠረታዊ እንክብካቤዎች .....	15
3 ድህረ ወሊድ አገልግሎት .....	19
3.1 ለእናት .....	20
3.2 ለሕፃኑ.....	21
4. □ፅንሰ ማቋረጥ አገልግሎት .....	23
□□ል ፪:-የሕፃናት ጤና አጠባበቅ .....	28
1. የተቀናጀ የጨቅላና የሕፃናት በሽባዎች መከላከልና ቁጥጥር ስልት (Integrated Management of Newborn and Childhood Illnesses) .....	28

ጥላማ .....	28
የስልቱ ማስፈጸሚያ .....	28
2. ከተወለዱ እስከ 2 ወር እድሜ ያላቸው ሕፃናት ዋና ዋና በሽታዎችና ህክምና:- .....	29
3. ከ2 ወር እስከ 5 ዓመት ዕድሜ ያላቸው ህፃናት ዋና ዋና በሽታዎች .....	42
3.1. ሳል ወይም የመተንፈስ ችግር ያለበት ህፃን ምርመራ .....	42
3.2. ተቅማጥ .....	45
3.3. ትኩሳት .....	55
3.4. የምግብ እጥረት እና የደም ማነስ .....	66
3.5. በህፃናት ላይ የሚታዩ ሌሎች በሽታዎች .....	75
4. የቤተሰብና የሕብረተሰብን ጤና ነክ ባህሪያት ማሻሻል .....	78
5 ቁልፍ የቤተሰብ ባህሪዎችን ለማራመድ የሚረዱ ዋና ዋና መልዕክቶች .....	81
6. በሕፃናት ላይ የሚፈፀሙ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች፣ .....	82
7. በሕፃናት ላይ ሊደርሱ የሚችሉ አደጋዎች .....	85
8. የሚጠበቁ ውጤቶች .....	86
9. ግምገማና ክትትል .....	87

# I. መግቢያ

ግብር እድገትና ብልጽግና ሲወሳ የእናቶችና ሕፃናት ሕመምና ሞት ከመስፈርቶቹ ውስጥ ጉልህ ስፍራ አሏቸው።

ከፅንሰ ማቋረጥ፣ ከእርግዝናና ከወሊድ ጋር በተያያዙ ምክንያቶች በህመም የሚሰቃዩት እና የሚሞቱት የእናቶች ቁጥር ከፍተኛ ነው። ለዚህ ደግሞ ድህነት፣ ኋላቀርነት፣ ምግብ እጥረትና ያለመመጣጠን፣ የጤና አገልግሎት አለመዳረስና ያልተመጣጠነ የህዝብ እድገት የሚያስከትሉአቸው ጠንቆች ናቸው። በተለይም የነዚህ ችግሮች ሰለባ የሆኑት እናቶችና ሕፃናት ጤንነታቸውን በሚጎዱ ልማዳዊ ድርጊቶች ተጠቁሞች ናቸው። እነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች የህብረተሰቡን ግብር መገኘታቸውና በተፈጥሮ ለበሽታ የተጋለጡ በመሆናቸው በጤና አጠባበቅ አገልግሎት አሳጣጥ ላይ ቅድሚያ ሊሰጣቸው ይገባል።

በከፍተኛ ግብር ላይ ለሚገኘውን የእናቶችና የህፃናት ህመምና ሞት ለመቀነስ ከሚያስችሉት ሥልቶች አንዱ የጤናማ እናትነት መርሆዎችን ተግባራዊ ማድረግ ነው።

እናቶች ጤንነት በእርግዝና፣ በወሊድና በድህረወሊድ ወቅት ለአደጋ የተጋለጠ በመሆኑ ልዩ ትኩረትና እንክብካቤ ሊደረግላቸው ይገባል።

በሀገራችን ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ህፃናት አምስት ዓመት ሳይሞላቸው ለህልፈተ ህይወት ይዳረጋሉ። እነዚህ ሕፃናት ሕግጋታቸው የሚያልፈው በዋናነት በሳንባ ምች፣ ተቅማጥ፣ በወባ፣ በኩፍኝና በተጓዳኝነት ጎልተው በሚታዩት በምግብ እጥረትና በኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ነው። የህፃናት ጤና አጠባበቅም የሚያተኩረው በእነዚህ የአብዛኛው ህፃናት ህመምና ሞት ምክንያት በሆኑት በሽታዎች ላይ ነው። እነዚህን የጤና ችግሮች በሚገባ ትኩረት ሰጥቶ መፍትሔ በመስጠት ብዙውን እልቂት መከላከል ወይም መቀነስ ይቻላል። በመሆኑም ለህፃናት የሚሰጠው የጤና አገልግሎት በተናጠል ሳይሆን በተቀናጀ መልኩ፣ ሕፃኑ የመጣበትን ችግር ብቻ መፍታት ሳይሆን የልጁን ሁለንተናዊ የጤና ችግር ለመግታት

የሚያስችል የተቀናጀ የጨቅላ ሕፃናትና የሕፃናት በሽታዎች ሕክምና ስልት ተቀይሶ በሥራ ላይ ውሏል።

እናቶችን ማስተማር ቤተሰብን ማስተማር በመሆኑ እናቶችና ሕፃናት እንዳይጎዱ የጤና አገልግሎት የት ሄደው ማግኘት እንደሚችሉ፣ በቤተሰባቸው ውስጥ ጤናን በማራመድ ምን ሚና እንደሚኖራቸው፣ በሽታን በመከላከል ረገድ የሚኖራቸውን ድርሻ ለማስተማር በሰለጠነ የጤና ኤክስፔንሽን ፓኬጅ ባለሙጽ ሙያዊ ድጋፍ ይደረግላቸው ዘንድ ይህ ፓኬጅ ተዘጋጅቷል።

## II. ገላማ

### 2.1. አጠቃላይ ዓላማ

የሕዝባችንን ከፍተኛ ቁጥር የያዙትን እናቶችንና ሕፃናትን ከህመም፣ ከሞትና ከአካል ጉዳተኛነት መታደግ እና የተስተካከለ አካላዊና አእምሮአዊ እድገት ማምጣት ።

### 2.2. □□□ ገላማዎች

- ለሕፃናት ህመምና ሞት ዋና ምክንያቶች የሆኑትን በሽታዎችና ጉጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ለመከላከል የሚያስችል የተቀናጀ የጤና አጠባበቅ አገልግሎት ለቤተሰብ ማቅረብ፣
- ለእናቶች የቅድመ ወሊድ፣ ወሊድና የድህረ ወሊድ የጤና አጠባበቅ አገልግሎቶች በተሟላ መልኩ አቀናጅቶ ማቅረብ፣
- እናቶች ከጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ራሳቸውንና ቤተሰባቸውን እንዲጠብቁ የተሟላ መረጃ እና ትምህርቶችን ማቅረብ፣
- ሕፃናትና እናቶች የክትባት አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ፣
- የጡት ማጥባትና የተጨማሪ ምግብ አመጋገብ ባህልን ማዳበር፣

- ህፃናት ሲታመሙ በፍጥነት ወደ ጤና ድርጅት እንዲወሰዱ ማስተማርና መድሃኒት ከታዘዘላቸውም በኋላ ቤተሰቦች መድሃኒቱን በጥንቃቄ እንዲሰጡና እንዲጨርሱ ትምህርት ማስተማር፤
- ቤተሰብና በአጠቃላይ ሕብረተሰቡ ስለ እርግዝናና ስለ ቤተሰብ እቅድ አገልግሎት ተገቢውን ትምህርትና ክህሎት በማግኘት አስፈላጊውን በካቤ ለእናቶች እንዲያደርግ የተሟላ መረጃና ትምህርት መስጠት፤
- በሕፃናት ላይ ሊደርሱ ስለሚችሉ አደጋዎችና እነዚህን አደጋዎች ለመከላከል መደረግ ስላለበት ቅ<sup>2</sup>መ ጥንቃቄ በቤተሰብ ደረጃ ትምህርት መስጠት፤
- እናቶችን ጥንቃቄ በጎደለው ውርጃ ሳቢያ ከሚመጡ የጤና ችግሮች ለመከላከልና አስፈላጊ የሕክምና  ማግኘት እንዲችሉ ማሳወቅና ማስተማር
- የወሊድ አገልግሎት እንዲያገኙ አግባብ ያለ<sup>2</sup> የቅብሎቶች የጤና አገልግሎት መስጠት፤

### III. የማስፈጸሚያ ስልቶች

- ሕብረተሰቡን ስለ ፓኬጃ አጠቃላይ ፕሮግራም በማስተኝ<sup>2</sup>ቅ፤
- መነሻ ጥናት በማካሄድ
- ህብረተሰቡን ያሳተፈ የሥራ ዕቅድ በማውጣት፤
- ስልጠና በማካሄድ፤
- ለፓኬጃ ሥራ ደጋፊ ሊሆኑ ከሚችሉ መንግሥታዊና መንግሥ<sup>2</sup>ዊ ካልሆኑ ድርጅቶችና የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ቅንጅት በመፍጠር፤
- በአካባቢው የሚገኙ የጤና ባለሙያዎችን በማሳተፍ፤
- ህብረተሰቡን በማስተማር፤ በማስተባበርና በመቀስቀስ በቀዓ<sup>2</sup> ተሳ<sup>2</sup> በማ<sup>2</sup>ረፈ፤
- በአካባቢው የሚገኘውን ሀብት በመጠቀም፤
- ሰርቶ ማሳያ ዘዴ በመጠቀም፤
- ልም<sup>2</sup> እና የተሞክሮ ል<sup>2</sup>ቅ<sup>2</sup>ዓ በማ<sup>2</sup>ረፈ፤
- የማነቃቂያ ዘዴዎችን በመጠቀም፤

- አካባቢያዊና ህጋዊ ደንቦችን በመጠቀም፤
- የክትትልና የቁጥጥር ሥራዎችን በማካሄድ፡፡

#### IV. የሚከናወኑ ዝርዝር ተግባራት፤

ሀ/ ስለ እናቶችና ህፃናት ጤና አጠባበቅ ፓኬጅ አጠቃላይ  
 ሮፍታ፡፡

- ለመስተዳድር አካላት
- በአካባቢው ለሚገኙ የጤና ተባባሪዎች
- ለታዋቂና ተሰሚነት ላላቸው የአካባቢ ነዋሪዎች፤
- ለሃይማኖት መሪዎች፤
- ለመገናኛ ብዙሃን፤
- በአካባቢው ለሚገኙ መንግሥታዊና መንግሥታዊ ላልሆኑ ድርጅቶች ወዘተ. ማስተዋወቅ፡፡

ለ/ በእናቶችና ህፃናት ዙሪያ አጠቃላይ መረጃዎች  
 ማሰባሰብ፤

- በአካባቢ  ጸሎት  እናቶች ቁጥር፤
- የቅድመ ወለድና የክትባት ክትትል የሚያደርጉ እናቶች ብዛት፤
- ዕድሜያቸው ከ5 ዓመት በታች የሆኑ ህፃናት ብዛት፤
- በአካባቢው የህፃናት ክትባት ሽፋን መረጃ፤
- በአካባቢው የሚተገበሩ  ጽልማዳዊ ድርጊቶች  ተ፡፡

ሐ/ ሕብረተሰቡን ያሳተፈ የሥራ ዕቅድ ማውጣት፤

- ቅድመ ጥናቱን መሠረት ያደረገና የህብረተሰቡን ሙሉ ተሳትፎ ያካተተ የሥራ ዕቅድ ማውጣት፤
- እንደአስፈላጊነቱ የሳምንት፣ የወር፣ የዓመት የሥራ ዕቅድ ማውጣት፤

መ/ ስልጠና መስጠት

- ለፓኬጁ ሥራ አጋዥ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን (የሰለጠኑ ወይም የልምድ ጤና ሠራተኞች፣ የልማት ሠራተኞች፣ ታዋቂና ተሰሚነት ያላቸው የአካባቢ ነዋሪዎችን ወዘተ.) ማሰልጠን፡፡

ሠ/ለፓኬጃ ደጋፊ ሊሆኑ የሚችሉ ማህበራት፣ መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንደ:-

- የቀበሌ መስተዳድር (አስተዳደራዊ ድጋፍ እንዲሰጥ)፣
- ትምህርት ቤት (ለመምህራንና ተማሪዎች ስለ ግል ንጽህና አጠባበቅ ትምህርት እንዲሰጥ)
- ማህበራት (የወጣቶች፣ የሴቶች ወዘተ.) ጋር ቅንጅት መፍፈር፣
- ባህላዊ ማህበራት- ፍጥጥ፣ ክቁብ ፍጥጥ እንዲሰጡ፣
- የመገናኛ ብዙሃን ቴሌቪዥን ሬዲዮና ጋዜጣዎች ህብረተሰቡን እንዲቀሰቅሱ ማድረግ ይገባል።

ረ/ በአካባቢ፣ በሚገኙ የጤና ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ የጤና ባለሙያዎችን በማሳተፍ ቴክኒካዊ ድጋፍ እንዲሰጡ ማድረግ ነው።፣

ሰ/ ህብረተሰቡን በመቀስቀስ በማስተማር፣ በማስተባበርና ተሳትፎውን በማሳደግ የባህሪ ለውጥ እንዲያመጣ ማፈራረም፣

- በቤተሰብ ደረጃ ስለ ግል ንጽህና አጠባበቅና አስፈላጊነት ሰፊና ቀጣይነት ያለው ትምህርት መስጠት። በስብሰባ፣ በዕድር፣ በሃይማኖት ቦታዎች፣ በህዝባዊ በዓላት ወዘተ. ስለ እናቶችና ህፃናት ጤና አጠባበቅ አስፈላጊነት ትምህርት መስጠት፣



## □□ል ፩.- □እናቶች ጤና አጠባበቅ

**1. ትኩረት ያለው የቅድመ ወሊድ አገልግሎት**  
አንዲት ሴት ከፀናታቸው ጊዜ አንሥቶ ምፃ እስከጀመራት ጊዜ ድረስ በጤና ባለሙያ የሚሰጣት የምክርና የሕክምና አገልግሎት የቅድመ ወሊድ አገልግሎት ይባላል። ይህ አገልግሎት ለነፍሰጡሯ በእርግዝና ወቅት ክትትል በማድረግ አስፈላጊውን የምክርና የሕክምና አገልግሎት በመስጠት በእርግዝናዋ በመውለጃዋ ጊዜ በራሷና በሚወለደው ህፃን ላይ የሚደርሰውን የህመምና የሞት አደጋ ለመቀነስ ብለው ለማስወገድ ይረዳል። ስለዚህ ይህንን ሁኔታ ለነፍሰጡሯ እንዲሁም በመውለድ ዕድሜ ክልል ላይ ለሚገኙ ሴቶች በማስተማር የአገልግሎቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ ያስፈልጋል። ትኩረት ያለው የቅድመ ወሊድ አገልግሎት የሚሰጠው አራት ጊዜ ሲሆን ይህም እንደሚከተለው ነው።

ሀ/ □መጸመሪጸ □ምርመራ □□

ይህ የቅድመ ወሊድ አገልግሎት የሚሰጠው እርግዝና መኖሩን ከተጠራጠረችበት ጊዜ ጸምሮ እስከ 4 ወር ድረስ ነው። በዚህን ጊዜ የሚሰጡት አገልግሎቶች የነፍሰጡሯን የወሊድና የጤና ሁኔታ መ□□ቅ፣ አካላዊ ምርመራ ማድረግ የደም ግፊት መለካት፣ የደም ናሙና ለተለያዩ ምርመራዎች (እንደ ኤች.አይ.ቪ፣ የአባላዘር በሽታዎች፣ የደም ማነስና የደም አይነት መለየት)፣ ክብደት መለካት፣ የመንጋጋ ቆልፍ ክትባት መስጠት እና የሚቀጥለውን የቀጠሮ ቀን ማሳወቅ ናቸው።

**የአገልግሎቱ ዓላማ**

- እርግዝናውን ማረጋገጥ
- ችግሮችን መለየትና ማከም
- የደም ማነስ፣ የደም ግፊት መጨመር፣ የአባለዘር በሽታዎች፣ የሽንት ምርመራ(የኩላሊት በሽታ፣ፕሮቲን መኖሩን፣ ግሎኮስ መኖሩን) □ከኋር በሽታ መኖሩን በምርመራ ማረ□□፣ ፣

**ለ/ ሁለተኛ □ምርመራ □□**

□ህ ምርመራ □ሚሰ□□ እርግዝናው ከ4-6 □ር ባለ□ ጊዜ ውስጥ ይሆናል። በዚህን ጊዜ የሚሰጠው አገልግሎት የደም ግፊት ምርመራ፣ የሽሉን የልብ ትርታ ማዳመጥና አካላዊ ምርመራዎችን ማድረግ በተጨማሪም የብረት እንክብል (iron) ማዕድን መስጠት ናቸው ።

**የአገልግሎቱ ዓላማ**

- የደም ብዛት መኖር አለመኖሩን ማረጋገጥና ካለም ማከም፣
- ችግሮችን መለየት፣ ማከም እና መከታተል፣
- አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ለከፍተኛ ሕክምና መላክ

**ሐ/ ሶስተኛ □ምርመራ □□**

□ህ ምርመራ □ሚሰ□□ እርግዝናው ስምንት ወር ሲሞላው ነው። የሚሰጡት አገልግሎቶች የደም ግፊት ምርመራ ማድረግ፣የሽሉን ሁኔ□ መመርመር ፣□□ም ናሙና መውሰድና መመርመር፣ ለወሊድ እና ለድንገተኛ ሁኔ□ ስለ ቅ□መ □ሊ□ ዝግጅት የምክር አገልግሎት መስጠት ናቸው።

**የአገልግሎቱ ዓላማ**

- የደም ብዛት መኖር አለመኖሩን ማረጋገጥና ካለም ማከም እና መከታተል፣

- ችግሮችን መለየትና ማከም አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ለከፍተኛ ሕክምና መላክ
- ጤናማ ሕፃን እንዲወለድ ማዘጋጀት
- ለወሊድ አገልግሎት ዝግጅት ምክር መስጠት

**መ/ አራተኛ ምርመራ**

ህ ምርመራ ሚሰጡ በዘጠነኛ ር ላ ሲሆን የሚሰጡት አገልግሎቶች የደም ግፊት መለካት፣ የሽሉን አካላዊ አቀማመጥ ምርመራ ማድረግ፣ የልብ ትርጉ ማዳመጥ ፣ ስለ ወሊድ ሥርዓት ማሳወቅ ፣ ስለ ልጅ አያያዝ ስነልቦናዊ ዝግጅት መስጠት፣ ስለ ጡት ማጥባት፣ ስለቤተሰብ ዕቅድ የምክር አገልግሎት መስጠትና ስለ ወሊድ ዝግጅት ምክክር ማድረግ፣

**የአገልግሎቱ ዓላማ**

- የደም ብዛት መኖር አለመኖሩን ማረጋገጥና ካለም ማከም እና መከታተል፣
- ችግሮችን መለየትና ማከም አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ለከፍተኛ ሕክምና መላክ እና መከታተል፣
- ጸልተለ እርግዝናን ለመከላከል /የቤተሰብ ዕቅድን በመጠቀም አራርቆ መውለድ እንደሚያስፈልግ ምክር መስጠት፣

**1.1. በእርግዝና ወቅት ሚታዩ አደገኛ ምልክቶችና ትኩረት የሚያስፈልጋቸው ሁኔታዎች**

ነፍሰጡሮች በእርግዝናቸው ወራት አንዳንድ ሕመሞች ሊደርሱባቸው ይችላሉ። እነዚህ ህመሞች ቶሎ ታውቀው አስፈላጊው ጥንቃቄ ካልተደረገ በነፍሰጠሯ ሕይወትና በጽንሱ ላይ ከፍተኛ አደጋ ሊያስከትሉ ይችላሉ። በተጨማሪም አንዳንድ ነፍሰጡሮች በተፈጥሮ ልዩ ክትትል ያስፈልጋቸዋል። በእርግዝና ጊዜ አደጋ ሊያስከትሉ የሚችሉ በሽታዎችና የሕመም ምልክቶች የሚከተሉት ናቸው።

**1.1.1 በእርግዝና ጊዜ የሚታዩ አደገኛ ምልክቶች**

- የፊት የእጅና የእግር እብጠት
- ከፍተኛ □ሆ□ ሀመም
- የዐይን ብሽር ብሽር ማለት
- ከማኅጸን የደም መፍሰስ
- ከፍተኛ ትኩሳት

**1.1.2 በእርግዝና ጊዜ ትኩረት የሚፈልጉ ጉዳዮች**

- የማያቋርጥ ማቅለሽለሽና ከፍተኛ ትውከት፣
- ከፍተኛ የራስ ምታት፣
- ደም የሚመስል/ከደም ጋር የተቀላቀለ ፈሳሽ ከብልት ሲወርድ ፣
- ብዛት ያለውና የሚያሳክክ ቢጫ ወይም ነጭ ፈሳሽ ከብልት መውረድ፣
- የነፍስ ጡሯ እድሜ ከ18 ዓመት በታች ከሆነ፣
- ዕድሜዋ ከ35 ዓመት በላይ የሆነች ሴት ለመጀመሪያ □□ ካረገዘች፣
- የበሬቱን እርግዝና በአኘራሲዮን ከተገላገለች፣
- ከስድስት በላይ የሆነ እርግዝና፣
- የጽንሱ እንቅስቃሴ መቆም፡፡

ከላይ የተጠቀሱት አደገኛ ምልክቶች እና ትኩረት የሚፈልጉ ጉዳዮች ሲታዩ ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትሉ ስለሚችሉ በፍጥነት ነፍሰጡሯን በመሸኛ (referral slip) ወደ ጤና ድርጅት መላክና ውጤቱን ተከታትሎ ማወቅና መመ□□ብ እንዲሁም ጥብቅ ክትትልም ማ□□ረ□ ጸስ□ል□ል፡፡

## 1.2. በእርግዝና ጊዜ የሚደረጉ ጥንቃቄዎች

አንዲት ነፍሰጡር የራሷን ጤንነት ጠብቃ ጤናማ የሆነ ሕጻን ለመውለድ እንድትችል በእርግዝናዋ ጊዜ የሚከተሉትን ጥንቃቄዎች ማድረግ ይገባታል።

### ሀ. የተመጣጠነ ምግብ መመገብ

ለአንዲት ሴት በእርግዝናዋ ጊዜ ከሚያስፈልጓት ነገሮች ዋናው የተመጣጠነ ምግብ መመገብ ነው። የምትመገባው ምግብ የራሷንና የፅንሱን የምግብ ፍላጎት ለማርካት በቂና የተመጣጠነ መሆን አለበት። ከጥራጥሬ፣ ከአትክልቶች፣ ፍራፍሬ፣ ከወተት፣ ከሥጋ፣ ቅቤ፣ የእህል ዘር እና የቅባት እህሎች፣ እንቁላል እያቀያየረች አዘውትራ መመገብ ያስፈልጋታል። ይሁንና ነፍሰ ጡሯ ይህንን ማግኘት የማትችል ከሆነ ቤት ያፈራውን እነዚህን ሊተኩ የሚችሉ ምግቦችን መመገብ እንደሚያሥፈልጋት ማሥተማር። ጽንሱ በማህፀን ውስጥ ባለበት ጊዜ የሚያገኘው የተመጣጠነ ምግብ በማህፀን ውስጥ ባለው ጊዜ ላለውና ከተወለደም በኋላ ለሚኖረው የሰውነት እድገት ወሳኝ መሆኑን ለነፍሰጡሯና ለቤተሰቧ አባላት ማስተማር፣ ክትትልም ማድረግ።

### ለ/ በእርግዝና ጊዜ የግል ንጽህና መጠበቅ

በእርግዝና ወራት ከምንጊዜውም የበለጠ ሰውነት ይቆሻሻል። ምክንያቱም ከውስጥ አካል ብዙ ቆሻሻ በላብ መልክ በቆዳ አማካይነት ስለሚወገድ ነው። ስለሆነም በየጊዜው ገላዋን በመታጠብ ንጽሕናዎን መጠበቅ አለባት። በተለይ በእርግዝና ጊዜ ከወትሮው ይበልጥ ንጽሕናን ለመጠበቅ የሚያዳግት ፈሳሽና ከማሕፀንና በብልት አካባቢ የሚወጣ ከሆነ አደገኛ ሊሆን ስለሚችል ነፍሰጡሯ በአቅራቢያዋ ወደሚገኘው የጤና ድርጅት በመሄድ አስፈላጊውን ክትትል እንድታደርግ ተገቢውን ትምህርትና ምክር መለገስ ያስፈልጋል።

ሐ/ አለባበስ

የነፍሰጡሯን የግል ንጽህና የተሟላ ለማድረግ የምትለብሰው ልብስ ንፁህ እንዲሆን ያስፈልጋል። ይህም ሲባል ሁልጊዜ አዲስ ልብስ ብቻ ትልበስ ማለት አይደለም። አሮጌውም ልብስ ቢሆን በየጊዜው እየታጠ በ ከእድፍ ነፃ እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል። የነፍሰጡሯ ልብስ በተቻለ መጠን ሰፊ ያለና የሚያመች መሆን አለበት። በእርግዝና ጊዜም መቀነትን በጣም አጥበቆ መታጠቅ አስፈላጊ አይደለም። ከዚህም በተጨማሪ ተረከዝ የሌለው ጫማ መጫማት ያስፈልጋል።

መ/ እረፍትና መዝናናት

የነፍሰጡር ሴት ጤንነት የተሟላ እንዲሆን ዕረፍት በጣም አስፈላጊ ነው። ሌሊት የስምንት ሰዓት እንቅልፍ ማግኘት አለባት። ይህም ሲባል ሥራ በፍፁም አትስራ ማለት አይደለም። የተለመደውን የዘወትር የቤት ሥራ ማከናወን ትችላለች። ይሁንና ከባድ እቃ ማንሳት፣ ረዥም መንገድ በእግር መሄድና በጣም ከባድ የሆኑ ሥራዎችን ሁሉ ባትሠራ □መረ□ል። ነገር ግን በእርግዝና ጊዜ ቀላልና ጠቃሚ እንቅስቃሴዎችን በዝግታና በጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ስለሆነ ዘወትር አጠር ያሉ መንገዶችን መሄድ፣ ቀላል የቤት ሥራዎችን መስራት □ነደሚያስፈልግ ምክር መስጠት ።

ሠ/ ነፍሰጡሯን የመንጋጋ ቆልፍ ክትባት መከተብ

ይህ ክትባት ነፍሰጡሯንና የሚወለደውን ህፃን በመንጋጋ ቆል□ በሽታ እንዳይያዙ ይከላከላል። የእዚህን ክትባት ጥቅም ለነፍሰጡሯና በመውለድ ዕድሜ ክልል ለሚ□ኙ ሴቶች በሙሉ ማስተማር ተገቢ ነው። ማንኛውም ነፍሰ ጡር የቅድመ ወሲድ አገልግሎት በሚሰጣት ወቅት ይህንኑ የመንጋጋ ቆልፍ ክትባት መከተቧን ወይም አለመከተቧን በሚሠጣት የክትባት ካርድ ላይ በመመልከት ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ክትባቱን ከዚህ

በፊት ጀምሮ ያላጠናቀቀች ከሆነ እንደ አሥፈላጊነቱ ክትባቱን መስጠት እና እንዳያቋርጡ ምክር መስጠት መዘንጋት የሌለበት ተግባር ነው። ነገር ግን ከዚህ ቀደም ያልተከተበች ከሆነ ክትባቱን ወዲያውኑ መከተብ ጸስ□ል□□ ል።

**1.3. ከእናት ወደ ልጅ የሚተላለፈውን ኤች.አይ.ቪ ለመከላከል የምክክርና የደም ምርመራ አገልግሎት**

➤ ከእናት ወደ ልጅ የሚተላለፈውን ኤች.አይ.ቪን ለመከላከል በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ የምክክርና የደም ምርመራ አገልግሎት ተጠቃሚ አንዲሆኑ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ኤች.አይ.ቪ ከእናት ወደ ልጅ □ሚተላለ□□ በእርግዝና፣ በወሊድና ከወሊድ በኋላ ጡት በማጥባት ነው ። ስለዚህ ነፍሰጡሯ ተመርምራ እራሷን ማወቅና ልጅዋን ከዚህ በሽታ የመከላከል ኃላፊነት አለባት ።

➤ ሁሉም እናቶች የኤች.አይ.ቪ መከላከል ዘዴዎችን ጤናማ ወሲብን፣ የአባለዘር በሽታን መለየትና ሕክምናውን በተመለከተ እንዲሁም በሕፃናት አመጋገብ ላይ ምክርና የድጋፍ መረጃዎችን ማግኘት አለባቸው።

➤ ወደ ልጅሻ የመተላለፍ እድሉን ለመቀነስ ምርመራዎን በወቅቱ ማድረግ፣ ቫይረሱ ካለባት መድኃኒቱን በመመሪያው መሠረት መውሰድ እና የሕጻኑን አመጋገብ □ንድትወስን በመመሪያው መሠረት ም□ር መስጠት።

**ሰ/ ነፍሰጡሯን የሚጎዱ ልማ□ዊ ድርጊቶችን ማስ□□□፣**

በእርግዝና ጊዜ ጉዳት ሊያስከትሉ የሚችሉ አንዳንድ ልማ□ዊ ድርጊቶች አሉ። እነዚህ ልማዶች እን□□አካባቢው የሚለያዩ ናቸው። ከእነዚህ ውስጥ ጎልተው የሚታዩትን ለአብነት ለመጥቀስ ሆድ ማሸት፣

ከሚጠቅማት ምግቦች እናትየውን መከልከል፣ ኮሶ በተደጋጋሚ መጠጣትና የመሳሰሉት ይገኙበታል። እነዚህን ለይቶ በማወቅ ጎጂነታቸውን ማስረዳት ይገባል። በተለይ ደግሞ በእርግዝና ጊዜ ሆድ ማሸት ያለ ጊዜ ምጥ እንዲመጣ በማድረግ ውርጃን ሊያስከትል ይችላል። በመታሸቱ ምክንያት ማህፀን ስለሚጎዳ ነፍሰጡሯ ብዙ ደም ሊፈሳትና እንዲሁም ጽንሱ ሊጎዳ ይችላል። በአጠቃላይ የነፍሰጡሯን ጤንነት ከሚጎዱ ልማዳዊ ድርጊቶች ሕብረተሰቡ ዘለቁ □ ጸለ□ □ብሕሪ ለ□ግ እንዲያመጣ ተከታታይነት ያለው መረጃና ትምህርት መስጠት ያስፈልጋል።

የመውለጃ ጊዜ ሲደርስ የሚያስፈልግ መሰናዶ /ዝግጅት/ ቤተሰቡንና የሚቀርቧትን የቅርብ ዘመዶች ለወሊድ የሚያስፈልጋትን ነገሮች ሁሉ እንዲያዘጋጁና ምጥ ከጀመረ በኋላ በማንኛውም ጊዜ ችግር ሊፈጠር ስለሚችል □□ □□ምታገኝበት የጤና ድርጅት ለመውሰድ የሚያስችል ዝግጅት እንዲያደርጉ በእርግዝና ጊዜ ማስተማርና ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ከሚያስፈልጉ ዝግጅቶች ለአብነት፡-

- የገንዘብ ዝግጅት፣
- ከወላጁ ጋር ቤተሰብ አብሮ መኖሩ፣
- ለህፃኑ የሚሆን ንፁህ ጨርቆችና ልብሶች
- የሕፃኑ የመኝታ ቦታ እና ሰፊ ያለ የማጠቢያ እቃ
- እናትየዋ ወልዳ እረፍት ላይ በምትሆንበት ጊዜ የምትመገበው ምግብ ቀደም ብሎ ማዘጋጀት □□ተ.



## 2. የማዋለድ አገልግሎት

በአገራችን ከወሊድ ጋር በተያያዙ ምክንያቶች በህመም የሚሰቃዩና ለሞት የሚዳረጉ እናቶች ቁጥር ከፍተኛ ነው። በወሊድ ጊዜ ለሞት ከሚያበቁት ምክንያቶች ውስጥ ጥቂቶቹ የደም መፍሰስ፣ አስቸጋሪ ምጥ (Obstructed Labour) ፣ በእርግዝና ወቅት የሚመጣ የደምግፊት ናቸው። ስለዚህ የወሊድ አገልግሎት የትና በማን መስጠት እንደሚችል በማስተማር ይህንን በከፍተኛ ሁኔታ ላይ ማረጋገጥ የሚገባውን የነፍስ ጡሮችና የጨቅላ ህፃናት ህመምና ሞት ለመቀነስ ብሎም ለማሥወገድ ይቻላል።

### 2.1 በወሊድ ጊዜ መደረግ የሚገባቸው ጥንቃቄዎች

- በነፍስ ጡሮ ማህፀን በደንብ ተኮማትሮ እንደሆነ ማረጋገጥ፣ (ከእምብርት በታችና ከፊኛ በላይ ያለው የወላጁ ሆድ ክፍል ሲነኩት የተድበለበለና የጠጠረ መስሎ ሲሰማ ተኮማትሮል ማለት ይቻላል) ።
- ብዙ ደም የሚወርዳት ወይም የማይወርዳት መሆኑን ማረጋገጥ።
- ብዙ ደም ማለትም በግምት ከግማሽ ሊትር በላይ የፈሰሳት ከሆነ የመጀመሪያ እርዳታ እና ኦክሲቶሲን (oxytocin) ሰጥቶ ወደሚቀጥለው የጤና ድርጅት በአሥቸኪይ መላክ።
- የሽንት መሽናት አስፈላጊነቱንም መንገርና እንድትሸና ማድረግ። የዚህ ጥቅም የሽንት ፊኛ በሽንት ከሞላ ማህፀን እንዳይሰበሰብና ደምም በብዛት እንዲፈስ ሊያደርግ ስለሚችል ይህን ለመከላከል ነው።
- የወላጁን ሆድ ቀስ በቀስ ማሸት፣ ይህም ማህፀኑ እንዲሰበሰብና ደም መውረዱን እንዲቀንስ ይረዳል።

- የወላዲ ብልት መሰንጠቅ ካለው ብዙ ደም እንዳይፈላት በንፁህ ጥጥ ወይም ፋሻ ወይም ጨርቅ የሚደማውን ቦታ ጭናን ገጥማ እንድትይዘው በማድረግ ወደሚቀጥለው የጤና ድርጅት በአስቸኳይ መላ□ ጸስ□ል□ል።

**2.2 ሕፃኑ እንደተወለደ የሚሰጡ መሠረታዊ**

**እንክብካቤዎች**

ሕጻናት ለህልፈተ ህይወት ከሚዳረጉባቸው ጊዜያቶች መካከል ከወለድ በኋላ የመጀመሪያው ሰዓታት፤ የመጀመሪያው ቀን፤ የመጀመሪያው ሳምንት፤ የመጀመሪያው ወርና የመጀመሪያው ዓመት ናቸው። አዲስ የሚወለዱ የአራስ ልጅ መሠረ□ ዋ እንክብካቤዎችም የሚከተሉት ናቸው።

**ህፃናት እንደተወለዱ ወዲያውኑ በእናት ሆድ ላይ ማስቀመጥ**

- ሕፃናት እንደተወለዱ ወዲያውኑ ከእናታቸው ሰውነት □ር □ገ ለ□ገ እንዲገናኙ ማ□ረ□ በ□ም □□ቅማል።
- በተለ□ም በበ□ታቸው አነስተኛ/ ከ2.5 ኪ.ግ. በታች/ የሆኑና ያለጊዜአቸው የተወለዱት /ከ 37 ሳምንታት በፊት / ከሌሎች ሕጻናት በበለጠ ከላይ በተገለጸው መንገድ መቀታቸው መጠበቅ አለበት። የውጭውን አየር ቅዝቃዜ መቋቋም ስለማይችሉና በምጥ ወቅትም ለረ□ም ሰጥታት በቂ ምግብ ሳያገኙና በእንግልት ሁኔታ ላይ ስለሚቆዩ በእናቶቻቸው ሆድ ላይ በማድረግ ከእናታቸው መቀት እንዲያገኙ በማ□ረ□ ቀ□□ ስራዎችን ማከናወንና የህጻናትን መቀት የመጠበቅ ሥራ መጸመር ጸስ□ል□ል።

**እትብትን በጥንቃቄ ማተብ**

- እትብትን ከአራስ ሕጻኑ ሆድ ሁለት ጣት በመራቅ በጥንቃቄ መቋ□ር፤ እንደገናም ሌላ ሁለት ጣት በመራቅ ሁለተኛ መቋጠርና በሁለቱ ቋጠሮዎች መካከል እትብቱን

መቁረፅ እና የተወለደውን ህፃን መመዝገብ /ቀኑን፣ ሰዓቱን፣ የታውን/፤

- ሕፃናት በቤት ውስጥም ይሁን በጤና ድርጅት ሲወለዱ እትብታቸው በጥንቃቄ ሊተብ  ባለፈ።  ህም በቴታነስ፤ ኤች.አይ.ቪ/ኤድስና ሌሎች ተላላፊ በሽታዎች እንዳይያዙ ይረዳቸዋል። ስለዚህም እናቶች በመጨረሻዎቹ የዕርግዝና ወራቶች የት እንደሚወልዱ በመወሰን ላይ ድጋፍ ሊደርግላቸው ከማስፈለጉም በላይ አዲስ ምላጭና ንፁህ ክር (የተቀቀለ) ማዘጋጀት ያስፈልጋል። እትብቱን በንፅህናና ደረቅ ሆኖ በጥንቃቄ ከመያዝ ባሻገር ምንም ዓይነት ባህላዊ ነገር ማድረግ አያስፈልግም። ብዙ ህፃናት ከማተብና በጥንቃቄ ከመያዝ በሚመጣ ጉድለት ለዕልፈተ ሕይወት ይዳረጋሉ። የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎ ወይም ግንባር ቀደም የጤና ተባባሪዎች እናቲቱ ማድረግ ስለሚገባትና ስለ ኤንፌክሽን ምልክቶችን በደንብ እንድትረዳ ማግለጫ ጸስልልል።

የህፃኑን ገላ ማድረቅና በንፁህ ጨርቅ መጠቅለል፤ ህፃናትን ከቅዝቃዜ ለመከላከል እንደተወለዱ ፈጥኖ በደረቅ ንፁህ ልብስ ወይም ፎጣ በሚገባ ማድረቅ፤ እግራቸውንና እራሳቸውን በሚገባ በወፍራም መቀት በሚሰጥ ጨርቅ ከላይ መሸፈን ያስፈልጋል።

እስትንፋስን በማስጀመር ሕይወት አድን ሥራ ማከናወን፤ (Neonatal resuscitation)

- አንድ ህጻናት ከእናታቸው ማህፀን እንደወጡ ትኩረት ተሰጥቶ ክትትል ሊደረግላቸው የሚገባው የመጀመሪያ ጉዳይ በአጥጋቢ ሁኔታ መተንፈሳቸውን ማረጋገጥ ነው። ህጻናት እንደተወለዱ አተነፋፈላቸውን የሰውነታቸውን ቀለም በሚጠቅም ማስተካከል  ባለፈ።
- በአጥጋቢ ሁኔታ የሚተነፍሱ ወይም ጤናማ አተነፋፈስ ያላቸው ህጻናት፤
  - ❖ እንደተወለደ ማልቀስ፤
  - ❖ በደቂቃ ከ30 በላይ መተንፈስ፤
  - ❖ የሰውነት ቀለም ትክክለኛ  ማማ (Pink) መሆን፤
  - ❖ አለማቃሰት (No Granting)

- ❖ በመተንፈስ ወቅት ከፍተኛ የደረት መሠርጎድ አለመኖር (No severe chest indrawing) ፣
- ❖ ዓሩ የሰውነት እንቅስቃሴ (normal neonatal reflex) መኖር፣
- ❖ ሕጻናት ወደ ውስጥ ሲተነፍሱ ደረታቸው   ማ ፣

ከዚህ ውጭ በሆነ ሁኔታና መተንፈስ ላልቻሉ አዲስ ለተወለዱ ህጻናት ሦስት ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ትንፋሽን የማስጀመር/የትንፋሽ   ሥራ (Neonatal Resuscitation) መከናወን ያስፈልጋል።

**እናት ጡት ፈጥኖ ማስጸመር**

ህፃናት እንደተወለዱ አንድ ሰዓት ባልሞላ ጊዜ -ስዓ (በደቂቃዎች) የእናታቸውን ጡት ቢያገኙ ለከፋ የጤና ችግር ከመጋለጥ ያድናቸዋል።

**የፀረ ህዋስ የዓይን ቅባት ማድረግ**

በእናቱ ማህፀን/ብልት ውስጥ የህጻኑ/ኗን ዓይን ሊጎዱ የሚችሉ ተላላፊ የአባላዘር በሽታዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ሁሉም ህጻናት ለዚህ አገልግሎት የተዘጋጀ ቴትራሳይክሊን የዓይን ቅባት መቀባት ይኖርባቸዋል። የሚደረገውም የቅባት መጠን -ዝ ፍሬ የሚያክል ሆኖ አደራ-ረገም ከውስጥ ወደ ውጭ (ከአፍንጫ ወደ ጀሮ አቅጣጫ) በሁሉም ዓይኖች ማድረግ   ገል።

**ቫቫታሚን ኬ መስጠት**

አዲስ የተወለዱ ህጻናት በቫይታሚን ኬ (Vitamine K) ዕጥረት ምክንያት የሚያጋጥማቸውን በቀላሉ የመድማት ችግር ለመከላከል ሁሉም ጨቅላ ህጻናት እንደተወለዱ ቫይታሚን ኬ (Vitamine K) እንዲያገኙ መደረግ አለበት። 1 ሚ.ግ ቫቫታሚን ኬ በህፃኑ ጭን ላይ (በመርፌ) ከፊት ለፊት ወደ ጎን በኩል (anterior- Lateral thigh) እንደተወለደ መሰጠት አለበት።

**ክብደት መመዘን**

አዲስ የሚወለዱ ሕጻናት ሁሉ በታቸው መመዘን ይኖርበታል። ክብደታቸው ከ1500 ግራም በታች የሆኑ ህጻናት በአስቸኳይ ወደ ወደሚቀጥለው የጤና ድርጅት (ጤና ጣቢያ) መላክ አለባቸው።

**የጨቅላ ህፃናት ገላ ማጠብ የሚጀምርበት ጊዜ**

ፊ ቅላ ህፃናት ገላቸውን መታጠብ ያለባቸው በተወለዱ ከ24 ሰዓት በኋላ መሆን ይኖርበታል። ከዚያ ቀድሞ ማጠብ ያለውን ጉዳት ማስረዳት ይገባል (ቅዝቃዜውን ስለማይችሉ ለሞት ሊዳረጉ ይችላሉ)።

**ጨቅላ ህጻናት ሲመሙ ሚ አደገኛ ምልክቶች**

የሚከተሉት በጨቅላ ሕጻናት ላይ ከታዩ በፍጥነት ወደ ጤና ቢጸ መላክ ይኖርባቸዋል።

- ትንፋሽ በደቂቃ  $\leq 30$  ም  $\geq 60$  ከሆነ፣ ማቃሰት፣ ከባድ የደረት መሰርጎድ /chest indrawing/፣ ምላስ እና ከንፈር መጥቆር/ሰማያዊ መሆን ካለ፣
- የማይጠቡ ወይም በትንሹ ብቻ የሚጠቡ ከሆነ፣
- የብብት ሙቀት ከ35.5 ዲግሪ በታች ወይም ሰውነቱ የሚቀዘቅዝ ከሆነ፣
- የብብት ሙቀት 37.5 ዲግሪ ወይም ከዚያም በላይ ወይም ሰውነቱ የሚያተኩስ ከሆነ፣
- ቀሉ እና ያበጡ ወይን ቆብ ወይም አይኑ የሚመግል፣
- ቀላ ሚመግል ም መዓ  ሽ  ጸለቡ ቆሰለ እትብትና የዙሪጽ ቆ ቀላ፣
- ኮንቫልሽን ከነበረው ወይም አሁን ካለው፣
- ጆንዲስ (በጣም ብጫ መሆን) ኖሮት
  - ሜ ከ24 ሰዓት ያነሰ ወይንም ከ2 ሳምንት በላይ ከሆነ ወይም
  - ቢጫ መሆኑ መዳፉን እና ውስጥ ሩን ካካተተ

### 3. ድህረ ወሊድ አገልግሎት

□□ህረ □ሊ□ □□ □ሚባለ□ እናትየዋ ከወለደችበት ቀን አንጦቶ እስከ ስድስተኛው ሃምሳት ድረስ ያለው ጊዜ ነው። በእነዚህ ጊዜያቶች ለእናትየዋና ለህፃኑ በባለሙያ የሚሰጠው የምክርና የሕክምና አገልግሎት የድህረ ወሊድ አገልግሎት □ባላል።

የጤና ኤክስፔንሽን ባለሙያዎች ወይም በእነሱ አስተባባሪነት □ሚሠሩ ግንባር ቀደም የጤና ተባባሪዎች ሊያከናውኑላቸው ከሚገቡ ተግባራት አንዱ እናቶች በወለዱ በመጀመሪያ፤ በሦስተኛ□ በሰ□ስተኛው ቀናትና በስድስተኛው ሳምንት ከዚያም እንደአስፈላጊነቱ በተጨማሪ ቀናት አራስ እናቶችንና አራስ ህጻናትን ድህረ-ወሊድ ጉብኝት በማድረግ የጤንነት ሁኔታቸውን መከታተልና ተከታታይ የምክር አገልግሎቶችን መሰጠት ቁልፍ ተግባር ነው።

እናቶችና የሕጻናት አሳዳጊዎች ህፃናት ከተወለዱበት ቀን ጀምሮ መልካም አዕምሮአዊና አካላዊ ዕድገት እንዲኖራቸው ለማድረግና ከበሽታና ከሞት ለመከላከል ተከታታይ የሆነ ትምህርትና ምክር ያስፈልጋቸዋል። እነዚህ መሠረታዊ የመልካም አስተዳደግና የሕፃናት አያያዝ ምክሮችና ድጋፎች በመሠረቱ ከዕርግዝናና ከዚያም በፊት ጀምሮ እናቶች/ወላጆች ማ□ኘት የሚገባቸው ቢሆንም በየዕለቱ በአራስ ሕፃኑ ዙሪያ ያሉትን ሁኔታዎች መሠረት አድርጎ በሚሰጡ ተከታታይ ምክሮች የባህሪ ለውጥ በማምጣት በኩል በጎ ተፅዕኖ ይኖራቸዋል። በዚህ መሠረት የምክር አገልግሎቶች እናቶች/ቤተሰቦችና አሳዳጊዎች ሊተ□በሩት ከሚችሉት አቅም አንፃር ደረጃ በደረጃ ከዚህ በታች እንደተመለከተው አድርጎ እንደአስፈላጊነቱ ሊሰጡ ይገባል።

### 3.1. ለእናት

በ□ህረ □ሊ□ □□ ለእናትየዋ መሠጠት የሚገባቸው ጠቃሚ ምክሮች

- እናትየዋ እስከ 15 ቀን ድረስ ፈሳሽ ስለሚኖራት በተቻለ መጠን በቀን ሁለት ጊዜ መታጠብና ንፁህ ጨርቅ እንድትጠቀም ምክር መስጠት። ይህ ፈሳሽ የተለያየ ቀለም አለው። ይኸውም ለመጀመሪያ ሦስት ቀን ደም የመሰለ፣ ከዚያም እስከ አሥር ቀን ድረስ የዘንጋዳ ወኃ የመሰለ፣ በኋላም ነጭ የመሰለ ይፈሳል። ይሁን እንጂ ምንም ዓይነት መጥፎ ሽታ የለውም። ብዛትና መጥፎ ሽታ ካመጣ ወደ ጤና ድርጅት ሄዳ አስፈላጊውን ህክምና እንድታደርግ መክሮ መላክ። መከታተልና ውጤቱንም መ□□በ መጸ□□።
- ወላጁ የሚቀጥለውን የእርግዝና ጊዜ ማራራቅ እንድትችል የምክር አገልግሎት በመስጠት የእርግዝና መከላከያ እንድታገኝ ማድረግ፣ /□□□-ን በቤተሰብ ዕቅድ ኤክስቴንሽን ፓኬጅ ይመልከቱ/
- ሕጻኑ እስከ ስድስት ወር ድረስ የእናት ጡት ወተት ብቻ በቂ መሆኑን ማሳወቅ፣ ወላድዋንም ማስተማር፣ የቤት ጉብኝትም ማድረግ፣ ከስድስት ወር በኋላ ግን ተጨማሪ ምግቦች መጀመር ለህፃኑ ዕድገትና ጤንነት አስፈላጊ በመሆኑ እንድትሰጠው ማስተማር፣
- ለሕጻኑ ቅቤ ወይም ዘይት መስጠት/ማስዋጥ አደገኛ መሆኑን ማሳወቅ፣
- ወላድዋ በአራስነቷ ጊዜ በጨለማ ቤት ውስጥ መተኛት የለባትም። ከምንጊዜውም ይበልጥ ሕጻኑን መከታተል እንድትችል ንጹህ አየርና የፀሐይ ብርሃን እንዲሁም የቤት ንፅህና እንዲኖር ያስፈልጋል።
- አራስ የሆነች ሴት በቂ ዕረፍት ማድረግ፣ የተመጣጠነ ምግብ መውሰድና ለሰውነቷ ጥንካሬ የሚረዳ ቀላል የሰውነት እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ያስፈልጋል።

### 3.2. ለሕጻኑ

በመጀመሪያው ዙር ጉብኝት የሚከናወኑ ተግባራት

በሀረ-ወሊድ ጉብኝት ወቅት የሕጻኑን ጤንነትና አጠቃላይ ሁኔታ ለመከታተል የሚደረግ ጉብኝት በዕርግዝና ወቅት ማረጋገጥ ቅመ-ወሊድ ጉብኝት ቀጣይና ተከታታይነት ያለው ሥራ ነው። በዚህ መሠረት በመጀመሪያ ርገር (ህጻኑ በተወለደ በ24 ሰዓት ውስጥ የድህረ ወሊድ ጉብኝት ወቅት የሚከተሉት ተግባራት ይከናወናሉ።

- እናቲቱ በጨቅላ ህፃን ላይ የሚታዩ አደገኛ ጋመም ምልክቶችን ማሳወቅና ሲታዩም ወደ ጤና ድርጅት ባስቸጋይ እንድትሄድ ማስገዝብ፤
- አዲስ ስለተወለደው ህጻን አጠቃላይ ጤንነትና ሁኔታ መወያየትና ማየት፤
- ቀጠሎ ጉዳት ጡት የማጥባት ጥቅም (እንገርን ፊ ምር) ማስገዝብ፤
- የህፃኑን ሙቀት መለካት፤
- የሕፃኑን ክብደት መለካት፤
- የህጻኑን ሙቀት በአግባቡ ስለመጠበቅና ይህም እንዴት እንደሚከናወን ማሳየት፤
- የሕጻኑን እትብት በንጽህናና ምንም ሳይደርጉ መያዝ እንደሚገባ፤
- እናቲቱ ተጨማሪና በቂ ምግብ፣ ፈሳሽና ዕረፍት የሚያስፈልጋት ስለመሆኑ።
- ምንም ተጨማሪ ነገር ውሃም ቢሆን ሳይሰጡ ለ6 ወራት ጉዳት ጡት ብቻ ስለማጥባትና ስለጥቅሙ (የወተት ምርቱ እንዲጨምር ስለማድረግ፤ ለህጻኑ በቂና የተመጣጠነ ምግብ ስለመሆኑና እናቲቱ ቶሎ እንዳታረግዝ ስለማድረግ)፤
- ጡት በማጥባት ሂደት ችግር ቢገጥም የጤና ባለሙያን ማማከር እንደሚገባ፤
- ሌትም ቀንም ተግባር ህጻኑን የማጥባት ጥቅም
- ስለ ትክክለኛ የጡት አጠባብ ዘዴ (Good attachment and positioning)
- የክትባትን ጥቅምና በወቅቱ ሕፃኑ እንዲከተብ ማስተማር፤



- ሌሎች ጉዳዮችን እንደሚኖረው ተጨባጭ ሁኔታ በማየት መምከርና መርዳት ይገባል።

**በሁለተኛ ዙር ጉብኝት የሚከናወኑ ተግባራት(በሦስተኛው ቀን)**

ህፃኑ በተወለደ በሦስተኛው ቀን ጉብኝት ሲሆን ዓላማውም

- በጨቅላ ህፃኑ ላይ አደገኛ የህመም ምልክቶች መኖራቸውን ማጣራት
- በመጀመሪያው የጉብኝት ዕለት ውይይት የተደረገባቸውና ምክክር የተደረገባቸው ጉዳዮች አፈጻጸምን ማየት፤
- ክትባት መውሰዱን ማረጋገጥ፤
- እናቲቱና ህጻኑ በወባማ አካባቢ አጎበር መጠቀማቸውን ማረጋገጥ፤
- ፍቅር ለህጻኑ መስጠት፤
- የውልደት ሰርቲፊኬት እንዲያገኝ ማድረግ፤
- በጠና የታመመ ህጻን ልጅ ስለሚያሳያቸው ፣ ምልክቶችን መቸ ወደ ጤና ድርጅት መውሰድ እንዳለባቸው ማተማር፤
- ሌሎች ጉዳዮችን እንደሚኖረው ተጨባጭ ሁኔታ በማየት መምከርና መርዳት ናቸው።

**በሦስተኛው ዙር ጉብኝት የሚከናወኑ ተግባራት፣(በሰባተኛው ቀን)**

- በአራሱ ሕጻን ላይ አደገኛ ምልክቶች /Danger Signs/ እንዳሉ መመልከት
- እናትን በተገቢ ሁኔታ ማጥባት እንድትቀጥል መምከርና ማበረታቻ
- ክብደታቸው አንስተኛ ለሆነ ሕፃን
- በበፊቱ ጉብኝት በተሰጡ ምክሮች እና ትምህርት ላይ መካጋር
- እናትን/ ቤተሰቡን ጨቅላውን ከኢንፌክሽን ስለመከላከል ማስተማር
- በቀደመው ጉብኝት ለእናት ቫይታሚን ኤ ካልተሰጠ 200,000 IU መስጠት
- ጨቅላው በቀድሞው ጉብኝት ካልተከተበ OPV<sub>0</sub> እና BCG መከተብ

**በ4ኛው ዙር ጉብኝት የሚከናወኑ ተግባራት**

ህፃኑ በተወለደ በ6ኛው ሳምንት ሲሆን ዓላማውም :-

- በበተኛው ጉብኝት ላይ የተጠቀሱትን አስፈላጊ ተግባራት ማከናወን፤
- እንዲሁም በበፊቱ ጉብኝት በተሰጡ ምክሮች እና ትምህርት ላይ መነጋገር፤
- በረ-አምስት (ፔንቲ 1) = DPT<sub>1</sub>-HepB<sub>1</sub>-Hib<sub>1</sub> እና " OPV1 ጨቅላውን መከተብ
- እናትን እና አባትን ስለ ቤተሰብ እቅድ አስፈላጊነት ማስተማር

**ማሳሰቢያ**

ያለጊዜአቸው ለተወለዱ፤ ክብደታቸው ከሚጠበቀው በታች ለሆኑና የተለያዩ ችግሮች ኖሮባቸው ልዩ ክትትል ለሚያስፈልጋቸው ህጻናት ወይም እናቲቱ ችግር ካለባት ተፈ ማሪ በህረ- ወሊድ፣ የጉብኝት፣ የምክርና የክትትል አገልግሎቶች ሊደረግ ይገባል።

**የጽንሰ መቋረጥ አገልግሎት**

ፅንሰን ማቋረጥ በሕግ የተፈቀደባቸው ሁኔታዎች

1. በሕክምና ሙያ በተፈቀደ የጊዜ ገደብ ውስጥ በህክምና ተቋም ፅንሰ ሲቋረጥ በወንጀል የማያሰቀጣው፤
  - ሀ/ በመደፈር ወይም በዘመድ መካከል በተደረገ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ምክንያት ፅንሱ የተገኘ ሲሆን፤
  - ለ/ የእርግዝናው መቀጠል በእናቲቱም ሆነ በፅንሱ ህይወት ወይም በእናቲቱ ወይም የልጁ መወለድ በእናቲቱ ጤንነት ወይም ህይወት ላይ አደጋ የሚያመጣ ሲሆን፤
  - ሐ/ ፅንሱ ሊድን የማይችል ከባድ የአካል ጉድለት ያለው (ዲፎርምድ) ሲሆን ወይም

መ/ አንዲት እርጉዝ ሴት የአካል ወይም የአዕምሮ ጉድለት ያለባት በመሆኗ ወይም ለአካለ መጠን ያልደረሰች በመሆኗ የሚወለደውን ህፃን ለማሳደግ የህሊናም ሆነ የአካል ዝግጅት የሌላት ሲሆን ነው።

የፅንሰ መቋረጥ አገልግሎት የሚሰጡ የጤና ተቋማት

- ማንኛውም የጤና ተቋም ፅንሰ ለማቋረጥ በብቃት የሰለጠነ ባለሙያ፣ ተገቢ የሕክምና መሣሪያዎችና መድኃኒቶች፣ አገልግሎቱን ለመስጠት ሌሎች አስፈላጊ ሁኔታዎች ያሟላ መሆን አለበት።
- የፅንሰ ማቋረጥ አገልግሎት እንዲሰጡ የተፈቀደላቸው የጤና ተቋማት የሚከተለውት ናቸው
  - የመንግሥትና የመንግሥት ያለሆኑ ሆስፒታሎች፣
  - የመንግሥትና የመንግሥት ያለሆኑ ጤና ጣቢያዎች
  - የሴቶች የሕክምና አገልግሎት መስጫ ተቋማት (Maternity Centers)
  - ከፍተኛ የግል ክሊኒኮች
  - መካከለኛ የግል ክሊኒኮች
- ፅንሰ ለሚያቋርጡ ሴቶች ምርመራ፣ የሕመም ማስታገሻ ዕርዳታ እና ወደ ሌላ የተሟላ አገልግሎት የሚሰጥ ተቋም የመምራት ኃላፊነት ያለባቸው
  - መለስተኛ የግል ክሊኒክና
  - የመንግሥትና የመንግሥት ያልሆኑ የጤና ኬላዎች

የፅንሰ ማቋረጥ አገልግሎት የሚሰጡ ባለሙያዎች

- የፅንሰ የማህፀን ሐኪሞች
  - ማንኛውም በህክምና ደክተርነት የመጀመሪያ ዲግሪ ወይም ከዚያ በላይ የሰለጠኑ ሐኪሞች
  - የጤና መኮንኖች
  - አዋላጅ ነርሶች
  - ክሊኒካል ነርሶች
- } በጽንሰ ማቋረጥ የተለየ ስልጠና የወሰዱ

ፅንስ የማቋረጥበት ጊዜ

- በህጉ መሠረት ፅንስ ለማቋረጥ የምትችል ሴት የምትፈልገውን የሕክምና አገልግሎት እጅግ ቢዘገይ በሦስት የሥራ ቀናት ውስጥ እነዚህ ሦስት ቀናት ለማግኘትና ለምርመራ የሚያስፈልጉ ናቸው።
- በወንጀል ህጉ አንቀጽ 551 መሠረት ከመጨረሻው የወር አበባ የመጀመሪያ ቀን ጀምሮ ከ 12 ሳምንታት ባነሰ ጊዜ ፅንስ የማቋረጥ አገልግሎት ሊሰጡ የሚችሉት የመንግሥትና የመንግሥት ያልሆኑ ሆስፒታሎች፣ የመንግሥትና የመንግሥት ያልሆኑ ጤና ጣቢያዎች፣ የሴቶች የሕክምና አገልግሎት መስጫ ተቋማት (Maternity Centers)፣ ከፍተኛ የግል ክሊኒኮችና መካከለኛ የግል ክሊኒኮች ናቸው።
- በማናቸውም ምክንያት ከ 13-28 ሳምንታት ባለው ጊዜ ፅንስ ሊቋረጥ የሚችለው ተገቢው የሰው ኃይልና ድርጅት ባለባቸው የግልም ሆነ የመንግሥት ሆስፒታሎች ወይም የእናቶች አገልግሎት መስጫ ማዕከላት ብቻ ናቸው።
- በህጉ መሠረት ፅንስ ማቋረጥ የሚችሉ ሴቶች ፅንሱን ለማቋረጥ ጊዜው ሳይዘገይ በፍጥነት እንዲመጡ በቂ ግንዛቤ እንዲያገኙ ማድረግ ያስፈልጋል።

#### 4. የድህረ ፅንሰ ማቋረጥ አገልግሎት

##### (Post abortal care)

ጥንቃቄ የጎደለው ፅንሰ ማቋረጥ ( unsafe abortion ) ለእናቶች ሞት መንስኤ ከሆኑት ውስጥ ዋነኛው ነው። በተጨማሪም ከሞት የተረፉት እናቶች የተለያዩ የጤና ችግሮች እንደ ደም መፍሰስ፣ የማህፀን ኢንፌክሽን፣ የማህፀን ግድግዳ መበሳት/መቀደድ፣ የሽንትና የሰገራ አለመቋጠር፣ /Fistula/ መካንነት ወዘተ. ያጋጥማቸዋል። ከእነዚህ የጤና ችግሮች በተጨማሪም ሥነልቦናዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ይደርስባቸዋል።

ለሴቶች የተመቸ የድህረ ፅንሰ ማቋረጥ አገልግሎት ለድንገተኛ / በራሱ ግፊት ለመጣ/ እንዲሁም በተሞከረ ወይም ተጀምሮ ባልተጠናቀቀ የፅንሰ ማቋረጥ ምክንያት የሚሰጥ ሁሉን አቀፍ የሆነ አገልግሎት ነው ።

የድህረ ፅንሰ ማቋረጥ ክብካቤ አምስት መሠረታዊ አገልግሎቶች፡-

##### ሀ) ሕብተሰቡን ማስተማር

ጸልተ  ለ  እርግዝናን በመከላከልና ጥንቃቄ የጎደለው የፅንሰ ማቋረጥ ስለሚያስከትሏቸው የተለያዩ ጉዳዮች ለሕብረተሰቡ ትምህርት መስጠት። ከዚህ በተጨማሪ ሕብረተሰቡ ስለፅንሰ ማቋረጥ የተደነገጉ ሕጎችን እንዲገነዘብና የአገልግሎቱ ተጠቃሚ እንዲሆን፣ ንፅሕናውን ወዳልጠበቀ አቅጣጫ እንዳይሄድ ማ  ረ  ይቻላል።

##### ለ) የምክክር አገልግሎት

ትክክለኛና የተሟላ መረጃን ያካተተ የሥነተ-ምግባር ጤና፣ የቤተሰብ ዕቅድና በፈቃደኛነት ላይ የተመሠረተ ምርመራን በተመለከተ የምክር አገልግሎት መስጠት።

##### ሐ) ድንገተኛ ሕክምና

በፅንሰ ማቋረጥ ምክንያት የሚደርሰውን የደም መፍሰስና የተያያዙ የጤና ችግሮችን በመለየት አስፈላጊ ሲሆን ወደ ጤና  ቢጸ መላ ።

**መ) የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት**

የቤተሰብ ዕቅድ በተመለከተ ስላለው ምርጫ በቂ ግንዛቤ ላይ  
ተመሠረተ ምር አገልግሎትና ነፃ ምርጫ የሚሰጥና  
ተለጸአርግዝና መከላከያ ዘዴዎችን ያካተተ አገልግሎትን  
ማቅረብ

**ሠ) ከሌሎች የሥነተ-ጥበቃ አገልግሎቶች ጋር የተቀናጀ የፅንሰ ማቋረጥ ክብካቤ**

የፅንሰ ማቋረጥ አገልግሎት የሚሹ ሴቶች አካላዊና አዕምሮአዊ ጤንነታቸውን በተለይም የሥነተ-ጥበቃ ጤና ፍላጎቶቻቸውን የሚያሟላ አገልግሎት ማግኘት ይሻሉ። ይህን ለማድረግ የጤና ባለሙያዎች የእያንዳንዱን ሴት ፍላጎት በሚገባ መረዳትና ተገቢውን አገልግሎት ከፅንሰ ማቋረጥ ክብካቤ ጋር አቀናጅተው መስጠት ይጠበቅባቸዋል። ለፅንሰ ማቋረጥ ክብካቤ ወደ ጤና ድርጅቶች የሚመጡ ሴቶች ከሚያስፈልጓቸው ተጨማሪ አገልግሎቶች መካከል፣ የአባላዘር በሽታዎች ምርመራና ሕክምና፣ በፈቃደኝነት ላይ የተመሠረተ የኤች.አይ.ቪ ምርመራና ክትትል፣ ስለጡትና ማሕፀን ካንሰር ምክክርና አገልግሎት፣ ስለ ሕፃናት አስተዳደግ፣ ክትባት፣ አመጋገብ፣ በሴቶች ላይ ስለሚፈፀሙ ጥቃቶች ምክርና አገልግሎት ዋና ዋናዎቹ ናቸው።

# □□ል ፪፡- የሕፃናት ጤና አጠባበቅ

## 1. የተቀናጀ የጨቅላ ሕፃናትና የሕፃናት በሽታዎች መከላከልና ቁጥጥር ስልት (Integrated Management of Newborn and Childhood Illnesses)

የተቀናጀ የጨቅላና የሕፃናት በሽታዎች ቁጥጥር ስልት ህፃናትን በመኖሪያ ቤታቸውም ሆነ በጤና ጣቢያ በምናይበት ጊዜ ያላቸውን የጤና ችግር ደረጃ በቀላሉ ለመለየት ነው። ይህም ከባድ በሽታን ከቀላል በሽታ በትክክል ለመለየትና የከባድ በሽታ ጠቋሚ ምልክቶችን በቀላሉ ለመለየት ያስችላል። ጠቋሚ ምልክቶችን በማየት ከባድና ቀላል በሽታዎችን በመለየት ወደሚቀጥለው የጤና ድርጅት በወቅቱ መላክ ይቻላል። ቀላል ችግሮችንም በቤት ውስጥ እንዴት እንክብካቤ መስጠት እንደሚገባ ለማስተማር ይረዳል።

### ጥላማ

- ❖ የሕፃናትን ሞትና ስቃይ ለመቀነስ፤
- ❖ ሕፃናት የተስተካከለ የአካልና የአእምሮ እድገት እንዲኖራቸው ለማድረግ።

### የስልቱ ማስፈጸሚያ

- የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች በቅርብ ከሚገኙ ጤና ጣቢያዎች ጋር በሚኖራቸው የቅብብሎሽ አገልግሎት የተቀናጀ የጨቅላ ሕፃናትና የህፃናት በሽታዎች ሕክምናና ቁጥጥር ስልትን ለማስፈጸም ከዚህ ቀጥሎ የተመላከቱትን ዋና ዋና ተግባራት የማከናወን ሃላፊነት ይኖርባቸዋል።
- ጨቅላዎች ተገቢውን እንክብካቤ እንዲያገኙ ለእናቶች ትምህርት መስጠትና አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ። የከፋ ችግር ያለባቸውን በቅርብ ወደ ሚገኝ ጤና ድርጅት እንዲሄዱ መምከርና ማመቻቸት
  - ለአራስ ህጻናት የድህረ ወሊድ ክትትል አገልግሎት መስጠት
  - ሁሉም ሕፃናት በወቅቱ ክትባታቸውን እንዲያገኙ ማበረታቻ

- በህፃናት ላይ የሚፈፀሙ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች እንዲቀንሱና እንዲቆሙ ለማድረግ ህብረተሰብን የማንቀሳቀስና የማስተማር ስራ መስራት።
- በከተማ በህፃናት ላይ ሊደርሱ የሚችሉ አደጋዎች እንዲቀንሱ ህብረተሰቡን ማስተማር።
- ለህጻናት ሞት ምክንያት የሆኑ ዋና ዋና በሽታዎችን በአቅማቸው፤ በተዘጋጀላቸው መመሪያና በሚሰጣቸው ስልጠናና ክህሎት መሠረት መለየት፤ መቆጣጠርና ማከም
- የጆሮና የጉሮሮ ህመሞችን መለየትና ወደ ጤና ድርጅት መላቅ፤
- የምግብ ዕጥረት ያለባቸውን ህጻናት የመለየትና ደረጃውን ማግኘት እንዲሁም ወደ ጤና ጣቢያ የሚላኩትን ለይቶ ማወቅና እንዲሄዱ ሁኔታዎችን ማመቻቸት፤
- ሌሎች የህፃናት የጤና ችግሮችን በመለየት ተገቢውን ምክር መስጠትና ወደ ጤና ድርጅት መላክ፤

## 2. ከተወለዱ እስከ 2 ወር እድሜ ያላቸው ሕፃናት ዋና ዋና በሽታዎችና ህክምና፡-

ሀ) የባክቴሪያ ኢንፌክሽን ርባ ጆንዲስ (በጣም ብጫ መሆን) መኖሩን ማጣራት፤ መለየምና የሚወሰዱ ርምጃዎች፤

ማንኛውም ርባ መመ ዕድሜው ከውልደት እስከ 2 ወር የሆነ ጭቅላ በሚገኝበት ጊዜ በቅድሚያ የባክቴሪያ ኢንፌክሽን ርባ ጆንዲስ (በጣም ብጫ መሆን) መኖሩን ከዚህ በታች በተቀመጠው መሠረት በመጠየቅ፤ በመመልከት፤ በማዳመጥና በመዳሰስ ማጣራትና ተገቢውን ርምጃ በአስቸካይ መጠን ጸስጦል።

- ትንፋሹን በደቂቃ ቁጠሪ 60 ወይም ከዚያ በላይ ከሆነ ርባ መሽ ቁጥሪ
- ከባድ የደረት መሰርጎድ አለው?
- ጸቃስታል? /አዳምጨ/



- የጨቅላውን እንቅስቃሴ አስተው□?
- ሲነካ ብቻ ነው የሚንቀሳቀሰው - ሲነካካም አይንቀሳቀስ
- እትብቱን ተመልከቺ ቀልቷል? ይመግላል?
- ሙቀቱን ለኪ (ቡብብት  $\geq 38$  □.ሴ ወይም ሲነኩት የሚሞቅ ወይም የብብት ሙቀት ከ 35.5 □.ሴ በታች ወይም ሲነኩት የሚቀዘቅዝ?)
- መ□ል □ጸ□ ሽ□□ ቆ□□ ላይ አለ?
- ጨቅላው ጆንዲስ /ቢጫነት/ አለው?
  - መዳፉና የውስጥ □□ሩ ቢጫ ሆኗል?
  - □ፊ ቅላ□ እድሜ ከ 24 ሰአት ያነሰ ነው? ወይም ከ 14 ቀናት በላይ ነው? የሚሉትን ጥያቄዎች መጠየቅና ህፃኑ ያለበትን ሁኔ□ በሚቀጥለ□ ሠንጠረዥ መሠረት መለየት ጸስ□ል□ል::

ምልክቶች	በሽታው ስርዓት/ስያሜ	ርምጃ/ህክምና
<ul style="list-style-type: none"> <li>• በደንብ የማይጠባ ወይም</li> <li>• ኮንቨልሽን ያለው ወይም</li> <li>• ፈጣን አተነፋፈስ ( ≥ 60 ትንፋሽ በቂቃ) በባለው</li> <li>• ከባድ የደረት መሰርጎድ ወይም</li> <li>• ማቃሰት ወይም</li> <li>• ሲነካ ብቻ የሚንቀሳቀስ ወይም</li> <li>• ሲነካም ምንም የማይንቀሳቀስ ወይም</li> <li>• ትኩሳት (≥38ዲ.ሴ ወይም ሰውነቱ ሲነኩት የሚያተኩስ) ወይም ቀዝቃዛ (&lt; 35.5ዲ.ሴ ወይም ሰውነቱ ሲነኩት ቀዝቃዛ) ከሆነ</li> </ul>	<p>በጣም ከባድ በሽታ</p> <p><b>Very severe disease</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ጡት ቶሎ ቶሎ እንዲጠባ ወይም መጥባት የማይችል ከሆነ የጠባብ የጡት ወተት ቶሎ ቶሎ እንዲጠባ አድርገ</li> <li>• ወደ ጤና ጣቢያ/ሆስፒታል ሲሄድ እንዳይበርደው እና እንዲሞቀው እናቱን ምክሪያት</li> <li>• ወደ ጤና ጣቢያ/ሆስፒታል ለህክምና እንድትወስደው እናቱን ምክሪ</li> <li>• በፍጥነት ወደ ጤና ጣቢያ/ሆስፒታል ለተፈ ማሪ ህክምና ላኪው</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <input type="checkbox"/> ቀላ እትብት ወይም</li> <li>• <input type="checkbox"/> ሚመጠል እትብት ወይም</li> <li>• መጠል <input type="checkbox"/> ጸ <input type="checkbox"/> ሽ <input type="checkbox"/></li> </ul>	<p>የተወሰነ/መለስተኛ የባክቴሪያ ኢንፌክሽን</p> <p><b>Local bacterial infection</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ጡት ቶሎ ቶሎ እንዲጠባ ወይም መጥባት የማይችል ከሆነ የጠባብ የጡት ወተት ቶሎ ቶሎ እንዲጠባ አድርገ</li> <li>• ወደ ጤና ጣቢያ/ሆስፒታል ሲሄድ እንዳይበርደው እና እንዲሞቀው <input type="checkbox"/> ፍቱን ምክሪያት</li> <li>• ወደ ጤና ጣቢያ/ሆስፒታል ለህክምና እንድትወስደው እናቱን ምክሪ</li> <li>• ወደ ጤና ጣቢያ/ሆስፒታል ለተጨማሪ ህክምና ላኪው</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• በጣም ከባድ በሽታ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ም የተወሰነ የባክቴሪያ ኢንፌክሽን ምልክቶች ምንም የሌሉት</li> </ul>	<p><b>ኢንፌክሽን የሌለው</b> <b>Infection unlikely</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• እናት ለጨቅላው የቤት ውስጥ እንክብካቤ እንዴት እንደምትሰጥ አስተምሪያት</li> <li>• ምን ስታይ በፍጥነት ወደ ጤና ድርጅት መሄድ እንዳለባት ለእናትዬው ማስረዳት</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• መጠን እና የውስጥ እግሩ ቢጫ የሆነ ወይም</li> <li>• እድሜው ከ 24 ሰዓት በታች የሆነ ወይም</li> <li>• <input type="checkbox"/> ሜትር 14 ቀንና ከዚያም በላይ የሆነ</li> </ul>	<p><b>ከባድ ጆንዲስ</b> <b>Severe jaundice</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ወደ ጤና ጣቢያ/ሆስፒታል ሲሄድ እንዳይበርደው እና እንዲሞቀው እናቱን ምክራያት</li> <li>• ጡት ቶሎ ቶሎ እንዲጠባ አድርገ</li> <li>• ወደ ጤና ጣቢያ/ሆስፒታል ለህክምና እንድትወስደው እናቱን ምክራያት</li> <li>• በፍጥነት ወደ ጤና ጣቢያ/ሆስፒታል ለተጨማሪ ህክምና ላኪው</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ቆጠታ እና አይኑ ቢጫ የሆነ</li> </ul>	<p><b>ጆንዲስ</b> <b>Jaundice</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ጡት ቶሎ ቶሎ ይጥባ</li> <li>• ህጻኑ ተገቢ መቀት እንዲያገኝ እንዳይበርደው ለእናቱ ምክር ስጪ</li> <li>• በየቀኑ ከ 20 - 30 ደቂቃ ገላው ራቁቱን <input type="checkbox"/> ከይ ብርሀን ያግኝ</li> <li>• ከ 2 ቀን በኋላ የክትትል ጉብኝት አድርገለት</li> </ul>

**ለ) ህጻኑ ተቅማጥ ያለው/ያላት መሆኑን ማረጋገጥ፤  
ደረጃውን ማወቅና መወሰድ ያለባቸው ርምጃዎች**

**ትርጉም**

ዕድሜው ከውልደት እስከ 2 ወር የሆነ ፊ ቅላ ተቅማጥ ጸጧው የሚባለው የዓይነ ምድሩ መጠን ከተለመደው ሲበልጥ፤ ቶሎ ቶሎ ሲሆን እና ብዙጧ ፀ ፀ ፀ-ሃማ ሲሆን ነው። ጡት የሚጠባ ጨቅላ አብዛኛውን ጊዜ ዓይነምድሩ ለስላሳ እና ቶሎ ቶሎ የሚመጣ ነው። ይህ ተቅማጥ አይደለም።

ተቅማጥ ጸለጧ ፊ ቅላ በሚገኝበት ጊዜ ከዚህ በታች የተቀመጡትን በማከናወን የተቅማጡን ዓይነትና የሰውነት ፀመጂሽሽ ለጽ ማጣራትና ተገቢውን ርምጃ በአስቸካይ መውሰድ ጸስጧል።

- ስንት ቀን አስቀመጠው?
- ተቅማጡ ደም የቀላቀለ ነው?
- የጨቅላውን ጠቅላላ ሁኔታ አስተውይ
  - ፩ ሲነካ ብቻ ነው የሚንቀሳቀሰው?
  - ፪ ሲነካካም አይንቀሳቀስም?
  - ፫ የሚወራጭ ወይም ነጭናጫ ነው?
- አይኖቹ ወደ ውስጥ ሰርጉደዋል?
- ሆዱ/ጎኑ ላይ ቆዳውን ቆንጠጥና ሳብ አድርገሽ ተመልከቺ
  - የተቆነጠጠውና የተሳበው ቆጧ ጧጧ ሰጧጧ ምሚመለሰጧ
  - በጣም ቀስ ብሎ /ከ 2 ሰኮንድ በላይ/ ነው?
  - ቀስ ብሎ /በ2 ሰኮንድ ውስጥ/ ነው?

ቀጥሎ ባለው ሠንጠረዥ መሠረት የህፃኑን የተቅማጥ ሁኔታ ማለየት /መመጧስ ጸስጧል።

ምልክቶች	□በሽ□□- □ረጽ (ስጸሜ)	ርምጃ/ሀክምና
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ከዚህ በታች ከተጠቀሱት ሁለቱ ከተገኙበት             <ul style="list-style-type: none"> <li>• ሲነካ ብቻ ነው የሚንቀሳቀሰው</li> <li>• ሲነካካም አይንቀሳቀስም</li> <li>• አይኖቹ የሰረጎዱ</li> <li>• የተቆነጠጠ ቆዳው በ□ም ቀስ ብሎ □ሚመለስ ከሆነ</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>ከባድ ዲሀይድሬሽን</b> <b>Severe dehydration</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• በፍጥነት ወደ ጤና ጣቢያ/ሆስፒታል ላኪው</li> <li>• ስትልኪው እናቱ በመንገድ ላይ ጨቅላውን □ምታጠጣውን ኢ.አር.ኤስ ስጫት</li> <li>• ጡት ቶሎ ቶሎ እንድታጠባው ምክሪያት</li> <li>• ሕጻኑ በቂ ሙቀት እንዲያገኝ እንድታደርግ ምክሪያት</li> <li>• እናት ልጇን ወደ ጤና ጣቢያ/ሆስፒታል ለሀክምና መ□ሰ□ እንዳለባት አስረጂያት/አሳምኛት</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ከዚህ በታች ከተጠቀሱት ሁለቱ ከተገኙበት             <ul style="list-style-type: none"> <li>• □ሚ□ራ□ □□ም ነጭናጫ</li> <li>• አይኖቹ የሰረጎዱ</li> <li>• የተቆነጠጠው ቆዳው ቀስ ብሎ □ሚመለስ ከሆነ</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>መለስተኛ ዲሀይድሬሽን</b> <b>Some dehydration</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• እናቱ የበለጠ እና ቶሎ ቶሎ ጡት እንድታጠባው አድርጊ</li> <li>• ምን ስታይ በፍጥነት ወደ ጤና ጣቢያ መሄ□ እንዳለባት ለእናትየው አስረጂ</li> <li>• ካልተሻለው ከ2 ቀን በኋላ ወደ ጤና ጣቢያ እንድትሄ□ አድርጊ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• በመለስተኛ □□ም ከባድ ዲሀይድሬሽን ለመሰ□ም በቂ ምልክቶች የሌሉት</li> </ul>	<p><b>ዲሀይድሬሽን የሌለው</b> <b>No dehydration</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• እናቱ የበለጠ እና ቶሎ ቶሎ እንድታጠባው አድርጊ</li> <li>• ምን ስታይ በፍጥነት ወደ ጤና ድርጅት መሄድ እንዳለባት ለእናትየው አስረጂ</li> <li>• ካልተሻለው ከ2 ቀን በኋላ ወደ ጤና ድርጅት እንድትሄድ አድርጊ</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• ተቅማጡ 14 ቀን ወይም ከዚያ በላይ ከቆዩበት</li> </ul>	<p><b>ከባድና የቆየ ተቅማጥ</b> <b>Severe persistent diarrhoea</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• በፍጥነት ወደ ጤና ጣቢያ/ሆስፒታል ላከው</li> <li>• ስትልከው እናቱ በመንገድ ላይ ጨቅላውን <input type="checkbox"/> ምታጠጣውን ኦ አር ኤስ ስጫት</li> <li>• ጡት ቶሎ ቶሎ እንድታጠባው ምክሪያት</li> <li>• ሕጻኑ በቂ ሙቀት እንዲያገኝ እንድታደርግ ምክሪያት</li> <li>• እናት ልጇን ወደ ጤና ጣቢያ/ሆስፒታል ለህክምና መውሰድ <input type="checkbox"/> እንዳለባት አስረጃጂያት/አሳምኛት</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ተቅማ <input type="checkbox"/> ም <input type="checkbox"/> ቀላቀለ ከሆነ</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/> ም ተቅማ <b>Dysentery</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• በፍጥነት ወደ ጤና ጣቢያ/ሆስፒታል ላከው</li> <li>• ስትልከው እናቱ በመንገድ ላይ ጨቅላውን <input type="checkbox"/> ምታጠጣውን ኦ አር ኤስ ስጫት</li> <li>• ጡት ቶሎ ቶሎ እንድታጠባው ምክሪያት</li> <li>• ሕጻኑ በቂ ሙቀት እንዲያገኝ እንድታደርግ ምክሪያት</li> <li>• እናት ልጇን ወደ ጤና ጣቢያ/ሆስፒታል ለህክምና መውሰድ <input type="checkbox"/> እንዳለባት አስረጃጂያት/አሳምኛት</li> </ul>

ሐ) የኤች. አይ.ቪ ኢንፎክሽን መኖሩን ማጣራት፤  
ደረጃውን ማወቅና መወሰድ ያለባቸው ርዕሰ ጉዳዮች

ማንኛውም ህፃን በቀጣይ ሊኖር በሚችል ወይም መታዬት በጀመረ የኤች.አይ.ቪ ኢንፎክሽን የተጋለጠ ሊሆን ስለሚችል፤ የሚከተሉትን ሁኔታዎች በማጣራት ወላጆችና ህጻናት የኤች አይቪ ምርመራ እንዲያደርጉና አስፈላጊውን ዕርዳታ በጤና ድርጅቶች እንዲያገኙ ማድረግ ያስፈልጋል።

- ❖ እናቲቱን ስለ ኤች.አይ.ቪ እና የፈቃደኝነት ምክር አገልግሎትና ምርመራ የምፍፍቅ እንደሆነ ጠይቂያት፤ የምፍፍቅ ከሆነ ምናልባት ለራሷም ይሁን ለልጇ ምርመራውን ለማካሄድ አስባ ፍፍቅ እንደሆነ ጠይቂያት ተመርምረው ከሆነም ርዕሰ ወይም ሕጻኑ ምርመራ ፍፍቃቸው ምን ነበር? ፍፍቅ ነበር?
- ❖ እናት ወይም ሕጻኑ ኤች.አይ.ቪ ፖዘቲቭ ከሆኑ ወይም ተመርምረው የማያውቁ ከሆነ ወደ ጤና ድርጅት ሄዶ አስፈላጊው የምርመራና የህክምና አገልግሎት እንዲያገኝ አድርጌ።

መ) ጨቅላው የአመጋገብ ችግርና የክብደቱ ሁኔታ ማጣራት፤ ደረጃውን ማወቅና መወለድ ያለባቸው ርምጃዎች

ምልክቶች	ስጹሜ	ርምጽ
<ul style="list-style-type: none"> <li>•ጡት በደንብ አልጎረሰም ወይም</li> <li>•በደንብ አይስብም ወይም</li> <li>•በ24 ሰአት ውስጥ ከ 8 ጊዜ ያነሰ ነው ጡት የሚጠባው <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>ም</li> <li>•አንዱን ጡት ሳይጨርስ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ሌላ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ሁራል <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>ም</li> <li>•በህመም ጊዜ ቶሎ ቶሎ እና ለረጅም ጊዜ ጡት እንዲጠባ አልተደረገም ወይም</li> <li>•ጨቅላው ከጡት ወተት ተጨማሪ ምግብና ፈሳሽ (ውሀም በሆኑ) ወስዷል <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>ም</li> <li>•የጨቅላው ክብደት ለ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ሜ. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ቅተኛ ነው <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>ም</li> <li>•በአፉ ውስጥ ቁስል ወይም ትራሽ አለ</li> </ul>	<p><b>የአመጋገብ ችግር ወይንም <input type="checkbox"/> ቅተኛ ክብደት</b></p> <p><b>Feeding problem or low weight</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• እናት ጨቅላው ጡት መጥባት በፈለገ ጊዜ ቀንና ሌሊት ጨምሮ ማጥባት እንዳለበት ምክራቸው እንዲሁም             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ጨቅላው በደንብ ካልጎረሰና በደንብ የማይስብ ከሆነ ስለትክክለኛ አስተቃቀፍና የጡት አጎራረስ እናት የዋን አስተምሪ</li> <li>✓ በ24 ሰአት ውስጥ ከ8 ጊዜ በታች የሚጠባ ከሆነ ከዚህ በተጨማሪ ቶሎ ቶሎ እንድታጠባ እናትን ምክራቸው</li> <li>✓ አንዱን ጡት በደንብ ከጠባ በኋላ ሌላኛውን እንዲጠባ አድርገ</li> <li>✓ ፊ ቅላ <input type="checkbox"/> ሲታመምና ከዳነ በኋላም ከወትሮው የበለጠ እንድታጠባ ምክራ</li> </ul> </li> <li>• ጨቅላው ከጡት ወተት ሌላ ምግብ ወይም ፈሳሽ የሚወስድ ከሆነ እስከ 6 ወር ጡት ብቻ እንዲጠባና በተጨማሪ የሚወስደውን ምግብና ፈሳሽ ቀስ በቀስ እንዲያቆም ማድረግ</li> <li>• ጡት መጥባት ፈጽሞ ያልጀመረ ከሆነ ጡት ማጥባት እንድትጀምር ለእናት መምከር</li> <li>• ጡት ማጥባት ፈጽሞ የማይቻል ከሆነ በቤት ውስጥ የተዘጋጀ የእንስሳት ወተት በኩባያ ወይንም በማንኪያ እንድትመግብ ለእናት መምከርና ማስተማር</li> <li>• የአፍ ቁስል ካለው በቤት ውስጥ እንዴት ማከም እንደሚቻል ለእናት አስተምሪ</li> <li>• በቤት ውስጥ እንዴት ልጇን መንከባከብ እንዳለባት አስተምሪ</li> <li>• <input type="checkbox"/> ፊ ቅላውን የአመጋገብ ችግርና የአፍ ቁስሉን በ2ኛ ቀን የክትትል ጉብኝት አድርገለት</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li> <input type="checkbox"/>በጊዜ ለጊዜ ማግኘት  <input type="checkbox"/>ቅተኛ ካልሆነ እና ሌላ የአመጋገብ ችግሮች ካሉት         </li> </ul>	<p><b>የአመጋገብ ችግር የለውም</b>  <b>No feeding problem</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>እናት በቤት ውስጥ ልጇን እንድትንከባከብ ምክር መስጠት</li> <li>እናት ልጇን በሚገባ ስለመገባት ማመስገን</li> </ul>
--	--	---

ሠ)  ጨቅላው የአመጋገብ ችግርና የክብደቱ ሁኔታ  ማግራትና የሚወሰዱ ርምጃዎች (ኤች አይቪ  ቲቪ እናት)

ምልክቶች	ስጻሜ	ርምጃ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ትክክለኛ ባልሆነና ንጽህናው ባልተጠበቀ መንገድ የተዘጋጀ ወተት ወይም</li> <li>• ትክክለኛ ያልሆነ የጡት ምትክ ወተት ወይም ሌላ ምግብ/ፈሳሽ መስጠት <input type="checkbox"/> ም</li> <li>• በቂ ያልሆነ የጡት ወተት ምትክ መስጠት ወይም</li> <li>• ኤች አይ ቪ ፖዘቲቭ እናት የጡት ወተት እያጠባች ሌሎች ተጨማሪ ምግቦችን ቀላቅላ ስትመግብ ወይም</li> <li>• <input type="checkbox"/>-<input type="checkbox"/> መጠን <input type="checkbox"/> ም</li> <li>• ለ <input type="checkbox"/> ሜ. <input type="checkbox"/> ቅተኛ ክብደት <input type="checkbox"/> ም</li> <li>• የአፍ ውስጥ ቁስል ወይም ነጫጭ ነጠብጣብ (ትራሽ)</li> </ul>	<p>የአመጋገብ ችግር <input type="checkbox"/> ም <input type="checkbox"/> ቅተኛ ክብደት</p> <p>Feeding problem or low weight</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <input type="checkbox"/> እናትን የአመጋገብ ምርጫ ማጠናከርና ምክር መስጠት</li> <li>• <input type="checkbox"/> እናት ጡት ምትክ መመሪያን ማስረዳት</li> <li>• እናት እና ቤተሰቡ ስለ አመጋገብ ሁኔታ ያላቸውን አመለካከት ለይተሽ እወቁ:: እናትየዋ ቀስ በቀስ ሌሎች ምግቦችንና ፈሳሾችን መስጠት እንድታቆም እርጃት::</li> <li>• እናት ጡጦ የምትጠቀም ከሆነ በኩባያ እንድትጠቀም አስተምሪያት</li> <li>• ጨቅላው ትራሽ ካለው በቤት ውስጥ ቁስሉን እንድታክም አስተምሪያት</li> <li>• እናት ጨቅላውን በቤት ውስጥ እንዴት መንከባከብ እንዳለባት ምክሪያት</li> <li>• የአመጋገብ ችግር ወይም የአፍ ቁስል/ትራሽ ካለው በ 2ኛ- ቀን ወደ ጤና ጣቢያ <input type="checkbox"/> ንድትሄድ ንገሪያት</li> <li>• ለ <input type="checkbox"/> ሜ. <input type="checkbox"/> ቅተኛ ክብደት ካለው በ14ኛው ቀን ወደ ጤና <input type="checkbox"/> ቢጸ <input type="checkbox"/> ንድትሄድ ንገሪያት</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• ለግራም ስብጥኝ ክብደት ግራም እና</li> <li>• የአመጋገብ ችግር ምልክቶች የሉትም</li> </ul>	<p>የአመጋገብ ችግር ግራም</p> <p>No feeding problem</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• እናት በቤት ውስጥ ህጻኑን እንዴት እንደምትንከባከብ ምክር ስጪያት</li> <li>• እናት ልጇን በሚገባ ስለመገባት አመስግኒያት</li> </ul>
--	---	--

**ረ) ጨቅላውን ፈጥኖ ወደ ጤና ድርጅት መመለስ**

ጨቅላ ህፃን ታሞ ጤና ድርጅት ከሄደ በኋላ ተገቢውን ህክምናና ምክር ለእናቲቱ ተሰጥቶ ቢመለስም የሚከተሉት ሁኔታዎች በጨቅላው ላይ ከታዩ/ከተከሰቱ እንዲመለስ ከተሠጠው የጊዜ ቀጠሮ በፊት ፈጥኖ ወደ ጤና ድርጅት እንዲመለስ እናቲቱን/አሳዳጊዋን መምከርና መርዳት ይገባል።

- በደንብ የማይጠባና የማይጠጣ ከሆነ
- ሀመሙ ከባሰበት
- ትኩሳት ካመጣ
- ቶሎ ቶሎ የሚተነፍስ ከሆነ
- የመተንፈስ ችግር ካለው
- ዓይነምድር ላይ ደም ከ□□

**ሰ) የጨቅላ ህጻን ክትባት ክትትል**

ጨቅላው/ዋ ከውልደት ዕለት እስከ 14ኛው ቀን ቢሲጅ እና ኦቪ-0 እንዲሁም በ6 ሳምንቱ ፔንታ1 (DPT1,HepB1-,Hib1,-OPV-1) መውሰዱን ማረጋገጥ፤ ካልወሰደ እንዲወስድ ማረጋገጥ።

### 3. ከ2 ወር እስከ 5 ዓመት ዕድሜ ያላቸው ህፃናት ዋና ዋና በሽታዎች

ዕድሜያቸው ከ5 ዓመት በታች ለሆኑ ህፃናት ከ70 በመቶ በላይ ለሆነው ሞትና ህመም ምክንያት የሆኑት በሽታዎችና የጤና ችግሮች ከዚህ ቀጥሎ በዝርዝር ቀርቦዋል።

ማንኛውም ታመመ ልጅ ወደ ጤና ተቋም በሚመጣበት ጊዜ በቅድሚያ ህፃኑ በጠና መታመሙን አደገኛ ምልክቶች የሚጠቁሙ ምልክቶች መኖራቸውን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ከእነዚህም

- ሕፃኑ መጠጣት ወይም ጡት መጥባት ካቃተው፤
- ሕፃኑ በጠባ ቁጥር ወይም ምግብ በወሰደ ቁጥር □□ጸ□ ሙሉ በሙሉ □ሚጸስታውከው ከሆነ፤
- ሕፃኑ በአሁኑ ሕመም ጊዜ አንቀጥቅጦት (አንድ ዓመት) ከነበረ ወይም አሁን ካንቀጠቀጠው (Convulsion) ፤
- ህፃኑ ከፈዘዘ ወይም ሕሊናውን ከሣተ አደገኛ የሆነ የጤና ችግር ወይም ሕመም አለው ማለት ነው። ስለዚህ በአስቸኳይ ቀሪውን ምርመራ አድርጎ /አከናውኖ/ አስፈላጊውን እርዳታ በአስቸኳይ ሰጥቶ ወደሚቀጥለው ከፍተኛ የጤና ተቋም መላክ አለበት። ህመምተኛ ህፃኑን ከመላካችን በፊት አስፈላጊውን የቅድመ ሪፌራል ዕርዳታና ምክር መስጠት ያስፈልጋል።

#### 3.1. ሳል ወይም የመተንፈስ ችግር ያለበት ህፃን ምርመራ

ሳል ወይም የመተንፈስ ችግር ያለው ልጅ የሳምባ ምች (Pneumonia) ወይም ሌላ ከበድ ያለ አጣዳፊ የመተንፈሻ አካል □ንፌክሽን (sever pneumonia) ሊኖረው ይችላል። የሳምባ ምች (Pneumonia) ማለት የሳምባ ኢንፌክሽን ነው።

#### መንስኤ

በአገራችን የሳምባ ምች በቫይረስ ወይም ባክቴሪያ በተባሉ ጀርሞች ሊመጣ ይችላል። ነገር ግን አብዛኛውን ጊዜ

መንስኤው ባክቴሪያ ነው። ብዙውን ጊዜ ስትሪፕቶኮክስ ኒሞንያ (Streptococcus pneumoniae) □ና ሒሞፍሊስ ሻይሎፊሎታሪያ (Hamophiles influenzae) በተባሉ ጆርሞች አማካይነት ይመጣል። ልጆች በባክቴሪያ የሚመጣ የሳምባ ምች በሚይዛቸው ጊዜ በኦክስጂን □ጥረት ወይም □ንፌክሽን በሰውነት □ቸው በመዛመቱ ምክንያት ሊሞቱ ይችላሉ። ብዙ ልጆች በሃል ወይም በአተነፋፈስ ችግር የሚመጡት □ንደ ጉንፋን በመሳሰሉት ቀላል የጤና ችግሮች ምልክቶች ነው። ይህ በቀላሉ በቤት ውስጥ በሚሰጥ □ንክብካቤ ሊረዱ ይችላሉ። ነገር ግን በጣም የ□መሙ ጥቂት ህፃናት መድሐኒት ያስፈልጋቸዋል። ምልክቶችን ቶሎ ቶሎ መተንፈስ (Fast breathing) □ና ህፃኑ በሚተነፍስበት ጊዜ □□□□ □□□□ □□ ችኛው ክፍል ወደ ውስጥ ሰርጉድ ማለት (lower chest indrawing) ናቸው። የደረት ግድግዳ ወደ ውስጥ ሥርጉድ ሥርጉድ ማለት የከፍተኛ የሳምባ ምች (Severe pneumonia) ምልክት ነው።

**ሳል ወይም የመተንፈስ ችግር ያለበት ህፃን ምርመራ፡-**

- ❖ ሳል ወይም የመተንፈስ ችግር ምን ያህል □ንደቆየበት መጠየቅ፤
- ❖ ቶሎ ቶሎ መተንፈሱን ማየት፤
- ❖ የደረት ግድግዳ ሥርጉድ ሥርጉድ ማለቱን ማየት
- ❖ ህፃኑ በተረጋጋበት ጊዜ ሲርሲር□ መኖሩን ማረጋገጥን ያጠቃልላል።

አንድ ህፃን ከ21 ቀን በላይ ሳል ወይም የመተንፈስ ችግር ካለበት የቆየ ሳል ምልክት ስለሆነ አስም፣ ትክትክ ወይም ሌላ ችግር ሊጠቁም ስለሚችል ለተጨማሪ ምርመራ ወደሚቀጥለው የጤና ድርጅት መላክ አለበት። አንድ ሃል ወይም የአተነፋፈስ ችግር ያለበት ልጅ ቶሎ ቶሎ የሚተነፍስ መሆን አለመሆኑን ለማወቅ በአንድ ደቂቃ ውስጥ ስንት ጊዜ □ንደሚተነፍስ መቁጠር ያስፈልጋል። ትክክለኛ ቆ□ራ ለማድረግ ህፃኑ ፀጥ ማለት አለበት። ከዚያም በደረቱ ክፍል ያለውን ልብስ ገልጦ የአተነፋፈስ □ንቅስቃሴውን መቁጠር ያስፈልጋል። የህፃኑን ትንፋሽ በአንድ ደቂቃ ውስጥ ከቆጠርን በኋላ ጸ□ኘው ቁጥር በጤነኛ ህፃን የሚጠበቅ መሆን

አለመሆኑን ለማወቅ ከዚህ ቀጥሎ ካለው የቦድሜና የትንፋሽ ቁጥር ሰንጠረዥ ጋር ማነፃፀር ያስፈልጋል፡፡

የህፃኑ <input type="checkbox"/> ሜ	ቶሎ ቶሎ ይተነፍሳል የምንለው
ከ2ወር <input type="checkbox"/> ከ 12 ወር ሆኖ	50 ጊዜ በደቂቃ ወይም ከዚያ በላይ ከተነፈሰ
ከ12 ወር <input type="checkbox"/> ከ 5 ዓመት ሆኖ	40ጊዜ በደቂቃ ወይም ከዚያ በላይ ሲተነፍስ ነው

ቶሎ ቶሎ መተንፈሱን ቆጥረን ካረጋገጥን ህመምተኛ  የሳምባ ምች አለው ማለት ነው፡፡ ሌላ ምርመራ ሳያስፈልገን በዚሁ መሠረት በሽ  ውን አውቀን ሕክምና መስጠት ይቻላል፡፡

**የደረት ግድግዳ ስርጉድ ማለት (lower chest indrawing):**

- መመው ሕፃን ወደ ውስጥ በሚተነፍስበት ጊዜ የደረቱ     ችኛው ክፍል ወደ ውስጥ ከገባ የደረቱ ግድግዳ ስር   ስር   ላል (lower chest indrawing)  ህ ምልክት አለ ለማለት ምል  ቱ በ  ል  መ  የትና ሁል ጊዜ  ማ  ይ መሆን አለበት፡፡ ይህን ምልክት በምናይበት ጊዜ ህፃኑ ፀጥ ባለና በተረጋጋ ሁኔ  መሆን አለበት፡፡ ይህ ምልክት ከ  የ የከባድ የሳምባ ምች ወይም የሌላ በጣም ከባድ በሽ  ምልክት ስለሆነ ህፃኑ አስቸኳይ ሕክምና ስለሚያስፈልገው ወደ ሚቀጥለው የጤና ተቋም በአስቸኳይ መላክ አለበት፡፡

የሳል ወይም የመተንፈስ ችግር አመዳደብና የሚወሰዱ ርምጽ- ችን የሚያሳይ ሠንጠረዥ

ምልክት	ስጸሜ (ጠሽ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ረጸ)	<input type="checkbox"/> ማ <input type="checkbox"/> ሰ <input type="checkbox"/> ርምጽ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• አጠቃላይ የአደገኛ ሕመም ምልክት (አንድም ቢሆን) ወይም</li> <li>• <input type="checkbox"/> ታችኛ <input type="checkbox"/> ደረት <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ስር <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ስር <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ካለ <input type="checkbox"/> ም</li> <li>• ልጁ በተረጋጋበት ጊዜ</li> </ul>	<p>ከባድ የሳምባ ምች ወይም ሌላ <input type="checkbox"/> ም ከባድ በሽ <input type="checkbox"/></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• እናት/አሳዳጊ በአስቸኳይ በአስቸኳይ ወደ ጤና <input type="checkbox"/> ቢጸ/ሆስ <input type="checkbox"/> ታል ላኪ</li> <li>• ለህጻኑ ጡት ማጥባትንና መመገብን መቀጠል፡፡</li> <li>• ትኩሳት ካለው ማስ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> መስጠት</li> </ul>

<p>ሲ.ር.ሲ.ር.ታ ከተሰማ (ስትራቴጂያል ካለው)</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ቶሎ ቶሎ መተንፈስ</li> </ul>	<p>የሳንባ ምች</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• በአስቸኳይ ወደሚቀጥለው የጤና ድርጅት መላጩ፤ ማስታገሻ መስጠት</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• የሳምባ ምች ወይም የከባድ በሽታ ምልክቶች ከሌሉ</li> </ul>	<p>የሳምባ ምች  <input type="checkbox"/> ለጡም ቀላል ሳል <input type="checkbox"/> ም ጉንፋን ሲሆን ይችላል።</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ሣሉ 21 ቀን በላይ ከቆየ ወደ ሚቀጥለው የጤና ድርጅት መላጩ</li> <li>• እናት ሳሉን <input type="checkbox"/> ምታስታግስበትን እና ጊሮሮውን የምታርስበትን መንገድ ምክራያት</li> <li>• በሽታው እየባሰ መሄዱን የሚጠቁሙ ምልክቶች ሲያዩ ቶሎ ልጁን እንዲያመጡት መምከር</li> <li>• ካልተሻለው በአምስተኛ <input type="checkbox"/> ቀን እንዲመቀስ አድርጊ</li> </ul>

### 3.2 ተቅማጥ

ብዙውን ጊዜ  ናቶች ልጆቻቸው ተቅማጥ ሲይዛቸው ተቅማጥ መሆኑ በሚገባ ያውቃሉ። በአገራችን የተቅማጥ በሽታ ከአምስት ዓመት በፊት ለሚገኙት ህፃናት ዋናው የህመምና የሞት ምክንያት ሆኖ  ኛል።  ህም 20%  ርሻ  ለል።

#### መንስኤው

ተቅማጥ :- በባክቴሪያ፣ በቫይረስ ወይም በፖራሳይት  ና በሌሎች ምክንያቶች ይመጣል። የተቅማጥ በሽታ ምች አብዛኛውን ጊዜ አዘውትረው የሚጠቁ የት ከ6 ወር  ከከ ሁለት ዓመት ዕድሜ ባሉ ህፃናት ላይ ነው።

#### የተቅማጥ ዓይነቶች

- አብዛኛው የተቅማጥ ዓይነት ውጫማ  ሚባለ  ና በድንገት ጀምሮ 14 ቀን ሳይሆነው የሚድን ነው፤
- ተቅማጡ 14 ቀን  ና ከዚያ በላይ ከቆየ የማያቋርጥ /ዩ.ር.ሲ.ስ  ንት/ ተቅማጥ ይባላል፤



➤ በተቅማጥ ዓይነምድር ላይ ደም ከንፍጥ የሚመስል ነገር ጋር ወይም ብቻውን ከ□□ □□ም ተቅማጥ □ባላል። አብዛኛውን ጊዜ የደም ተቅማጥ የሚመጣው ሺገላ በሚባል የባክቴሪያ ዓይነቶች ነው። በአሜባ ምክንያት ሊመጣ ይችላል። ይሁን እንጂ አዘውትሮ የሚከሰት አይደለም።

**ተቅማጥ □ጸ□□ ልፀ ምርመራ**

አንድ ልጅ ውሃማ ተቅማጥና የደም ተቅማጥ በአንድ ጊዜ ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ አንድ ተቅማጥ የያዘው ህፃን በምንመረምርበት ጊዜ በጥንቃቄ መሆን አለበት።

ተቅማጥ የያዛቸው ጨቅላ ህፃናት ላይ በተጠቀምነው ዘዴ መሠረት መመርመርና የተቅማጡን ዓይነት እንዲሁም የሰውነት መሟሸሽ ደረጃ ማጣራትና የተጠቀሱትን እርምጃዎች መውሰድ ያስፈልጋል። ከዚህ በታች ያሉትን ሰንጠረዞች ይመልከቱ።

**ከሰውነት ብዙ ፈሳሽ በተቆማጥ አማካይነት ሲወጣ የሚቀድም ምልክቶችና የሰውነት የመሟሽሽ ደረጃዎች**

የሰውነት መሟሽሽ ምልክቶች	የሰውነት መሟሽሽ ሁኔታ	የሚያስፈልግ ምርመራ
<p>ከሚከተሉት ምልክቶች ሁለት ካሉ ከዚህ ጎን ያለውን የሰውነት መሟሽሽ /dehydration/ ሁኔታ ጸላጸሉ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• መፍዘዝ ወይም ሕሊናን መሳት</li> <li>• የዓይን መጎድጎድ</li> <li>• መጠጣት አለመቻል በጣም በደከመ ሁኔታ መጠጣት</li> <li>• የቆይታ መለቀቅ ቀስ ብሎ መመለስ</li> </ul>	<p>ከፍተኛ የሰውነት መሟሽሽ (Severe dehydration)</p>	<p>የሚያስፈልግ ምርመራ</p> <p>- በአስቸኳይ ወደሚቀጥለው የጤና ድርጅት መላክ፣ ፈሳሽ መውሰድ ከተቻለ ህይወት አድን ጎጥረ መድኃኒት (ORS) መጠቀም /መቀጠል/</p>
<p>ከሚከተሉት ምልክቶች ሁለት ካሉ ከዚህ ጎን ያለውን የሰውነት መሟሽሽ/dehydration/ ሁኔታ ጸላጸሉ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• መወራጨትና መነጫነጭ</li> <li>• የዓይን መጎድጎድ</li> <li>• የቆይታ ጥማት</li> </ul>	<p>መለስተኛ የሰውነት መሟሽሽ (Mild dehydration)</p>	<p>- በአስቸኳይ የጤና ድርጅት ህይወት አድን ጎጥረ መድኃኒት መጠቀም /መቀጠል/</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• የቆዳ መለጠጥ መዘግየት</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <input type="checkbox"/> መለስተኛም ሆነ ከፍተኛ የሰውነት መሟሸሽ ምልክቶች አለመኖር</li> </ul>	<p>የሰውነት መሟሸሽ <input type="checkbox"/>ም (No Dehydration)</p>	<p>ጡት ብቻ የሚወሰድ ከሆነ ህይወት አድን ዓጥረ መድኃኒት መስጠት እና ጡቱን ቶሎ ቶሎ መሥጠት፣ ጡት ብቻ የማይጠባ ከሆነ / ተጨማሪ ምግብ ለሚወስድ ልጅ/ በቤት ውስጥ የሚዘጋጁ ምግብ አዘል ፈሳሾች /አጥሚት፣ ሾርባ፣ የፍራፍሬ <input type="checkbox"/> ማቂ፣ <input type="checkbox"/>ፍ፣ <input type="checkbox"/> ወዘተ./ መስጠት፣ በሽ<input type="checkbox"/>፣ <input type="checkbox"/> ባሕር መሄዳን የሚጠቁሙ ምልክቶች ሲታዩ ልጁን ቶሎ እንዲያመጡት መምከር፣ በአምስተኛ<input type="checkbox"/> ቀን ካልተሻለው እንደገና ማየት</p>

ምን ያህል ኢ.አር.ኤስ ወይም ሌላ ፈሳሽ ማጠጣት ይገባል?

ከ2 ዓመት በታች ለሚገኙ ሕፃናት ባስቀመጣቸው ቁጥር ከ50-100 ሚ.ሊ (አንድ የቡና ሲኒ) እና ከ2 ሰዓት ከ10 ዓመት ለሚገኙ ህፃናት ደግሞ ከ100-200 ሚ.ሊ (ሁለት የቡና ሲኒ) ፈሳሽ ማጠጣት ያስፈልጋል። ነገር ግን ሕፃኑ ከዚህ በላይ ፈሳሽ መጠጣት ከፈለገ ማጠጣት ይቻላል። ዕድሜያቸው ከዚህ በላይ ከፍተኛ ስሜት ሕፃናትና አዋቂዎች ግን የፈለጉትን ያህል ውሃ መጠጣት ይችላሉ። ከወትሮው የበለጠ ፈሳሽ መስጠት የሚጠቅመው በተቅማጡ ምክንያት የሚጠጡ ፈሳሽ ለመተካትና በዚህም ምክንያት የሚመጣውን የሰውነት መሟሸሽ (Dehydration) ለመከላከል ነው።

ሕይወት አድን ንጥረ መድኃኒት (ORS) አዘጋጃጀት ይህ መድኃኒት በተቅማጥ ጊዜ የሚወጣውን ጠቃሚ ንጥረ ነገሮች በሙሉ እንዲተካ ተደርጎ የተዘጋጀ በመሆኑ በቤት ውስጥ ሁልጊዜ ማስቀመጥና ማጠጣት የበለጠ ይመረጣል።

- እጅን በሃሙናና በውሃ መታጠብ፤
- አንድ ሊትር የባንቧ ውሃ (የባንቧ ውሃ ወይም ፈልቶ የቀዘቀዘ ውሃ) ለክቶ በንጹህ ዕቃ ማስቀመጥ፤
- አንድ ከረጢት የሕይወት አድን ንጥረ መድኃኒት (LSachet) በተለካው ውሃ ውስጥ ጨምሮ እስኪሟሟ በደንብ መበጠጥ፤
- የተበጠበጠውን መድኃኒት በሲኒ ቀድቶ በማንኪያ በትንሽ በትንሹ ማጠጣት። ካስታወከው ከ5-10 ደቂቃ ቆይቶ ማጠጣቱን መቀጠል፤
- የተበጠበጠ መድኃኒት ከድኖ በማስቀመጥ እስከ 24 ሰዓት ጊዜ ድረስ መጠቀም ይችላል፤ ከ24 ሰዓት በኋላ ካላለቀ መድፋትና ሌላ አዲስ መበጠጥ፤

**ለሕፃኑ ከወትሮው የበለጠ ምግብ መመገብ/ማብላት**

- ❖ ለሕፃኑ መሰጠት ከሚገባቸው ምግቦች መካከል ጥቂቶች የእናት ጡት ወተት (በተለይም ከ6 ወር በታች ለሆኑ ሕፃናት) ፣ ወተትና የወተት ውጤቶች፣ ገንፎ፣ እንቁላል፣ ሥጋ፣ ቅመም የሌለው አልጫ ፍትፍት፣ ሙዝ፣ ብርቱካን ናቸው። ነገር ግን ይህንን ማግኘት የማይችሉ ቤተሰቦች ቤት ያፈራውን የምግብ ዓይነት ከወትሮው ጨመር አድርገው መመገብ ይችላሉ።
- ❖ ተቅማጡ ከቆመ በኋላ ሕፃኑ ወትሮ ከሚመገብበት ጊዜያቶች አንድ ተጨማሪ የመመገቢያ ጊዜ ጨምሮ ለሁለት ሳምንታት ያህል መመገብ ያስፈልጋል። በተቅማጥ ጊዜ ከወትሮው የበለጠ ምግብ መመገብ የሚጠቅመው በተቅማጡ ምክንያት የሚወጣውን ለሰውነት ጠቃሚ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ለመተካትና በዚህም ምክንያት ሊከሰት የሚችለውን የምግብ እጥረት በሽታ ለመከላከል ነው።

**ተቅማጥ የያዘው ሕፃን ከላይ በተገለጸው እየተረዳ፡-**

- ካልተሻለው
- ትውኩቱ ከቀጠለ
- ከዓይነምድር ጋር ደም ተቀላቅሎ ከታየ እና ትኩሳት ካለው፤ ወዲያውኑ ወደ ሚቀጥለው ጤና ድርጅት ቤተሰቦች እንዲሄዱ ማግለጫና ከዚያም በመከታተል ሪፖርት ማድረግ መቻል ያስፈልጋቸዋል።

**መለስተኛ የፈሳሽ ማጣትን በ ORS ማከም**

- ❖ □ታዘዘለትን ORS በ 4 ሰአት ውስጥ እንዲወስድ አድርገ

**መጀመሪያ በ 4 ሰአት ውስጥ ምን ያህል ኦ ኦር ኤስ ይወስዳል የሚለውን □□ቂ፤ ለዚህም ቀጥሎ ያለውን ሳጥን ተመልከቺ :-**

□□ሜ	ከ 4 ወር በ□ች	4-12 □ር	12 □ር - 2 አመት	2 - 5 አመት
ክብደት	< 6 ኪ.ግ	6 - 10 ኪ.ግ	10 - 12 ኪ.ግ	12 - 19 ኪ.ግ
ኦ ኦር ኤስ በ ሚሊ	200 - 400	400 - 700	700 - 800	900 - 1400
በቡና ስኒ (ባለ 70 ሚሊ)	3 - 6	6 - 10	10 - 11.5	13 - 20

**ማሳሰቢያ**

የህፃኑን እድሜ የምትጠቀሙት □□በ□ቱ ካል□□ቀ ብቻ ነው። ክብደቱን በመጠቀም ህፃኑ የሚያስፈልገው ኦ ኦር ኤስ 75 ሚሊ በኪ.ግ ተደርጎም ሊሰላ ይችላል።

ህፃኑ ከተሰላው መጠን በላይ ኦ ኦር ኤስ መጠጣት ከፈለገ ይጠጣ

- ❖ ከ 6 ወር በታች ሆኖ ጡት የማይጠባ ከሆነ ከ ኦ ኦር ኤስ በተጨማሪ ከ 100 - 200 ሚሊ ( 2 የቡና ሲኒ) ንፁህ ውሀ በ 4 ሰአት ውስጥ እንዲወስድ አድርገ።
- ❖ ፈሳሽ በምትሰጥበት ጊዜ እናት እንዲህ እንድታደርግ ንገራያት
- ❖ በአንድ ብዙ ኦ ኦር ኤስ ከመስጠት ይልቅ ትንሽ ትንሽ እና አሁንም አሁንም በስኒ መስጠት
- ❖ ህጻኑ ካስመለሰው ለ 10 ደቂቃ ጠብቃ ቀስ ብላ ማጠጣቷን እንድትቀጥል
- ❖ ህጻኑ ጡት መጥባት ከፈለገ እንድታጠባው መምከር

#### ከ 4 ሰአት በኋላ

- ❖ ህጻኑን ደግመሽ መርምረሽ ለፈሳሽ እጦት ሰይሚው
- ❖ ምግብ እዚያው ኦ አር ኤስ እየወሰደ መመገብ እንዲጀምር አድርጊ
- ❖ ለእናቱ ኦ አር ኤስ ቤት ውስጥ እንዴት እንደሚዘጋጅ አሳያት

#### በተፊ ማሪም

- ምን ያህል ኦ አር ኤስ በ 4 ሰአት ውስጥ መስጠት እንዳለባት አሳያት
- ለፈሳሽ እጦቱን ለማከም የሚያስፈልገውን እና ተጨማሪ 2 የኦ አር ኤስ እሽግ ስጪያት
- አራቱን የቤት ውስጥ ህክምና ተግባራት አስረጃያት እነዚህም
  - ❖ ተጨማሪ ፈሳሽ መስጠት
  - ❖ ዚንክ መስጠት
  - ❖ ምግብ መስጠትን መቀጠል
  - ❖ መቼ መመለስ እንዳለባት ማስተማር

#### ለእናትየው የዚንክ አሰጣጥን ዘዴ ማስተማር

- ❖ ምን ያህል መስጠት እንዳለባት አስተምሪያት
  - እስከ 6 ወር 1/2 ኪ.ኒን በቀን አንድ ጊዜ ለ 10 ቀን
  - ከ 6 ወር በላይ 1 ኪ.ኒን በቀን አንድ ጊዜ ለ 10 ቀን
- ❖ ኪ.ኒንን እንዴት መስጠት እንዳለባት አስተምሪያት
  - ከ 1 አመት በታች - ኪ.ኒንን በግለበ ግለት ወተት ወይም ኦ አር ኤስ ወይም በንጹህ ውሀ በስኒ ውስጥ መበጥበጥ
  - ከ1 አመት በላይ - ኪ.ኒንን እንዲውዓ ግለግለ በንጹህ ግለግለ በዓ ግለግለ እንዲጠጣው ማረጋገጥ
  - ዚንኩ ለ10 ቀናት መስጠት እንዳለባት በደንብ ንገሪያት

**ሀ) ጡት ማጥባት፡-**

ዕድሜያቸው ከ6 ወር በታች ያሉ ሕፃናት የእናት ጡት ብቻ መጥባት ይገባቸዋል። ሌሎች ፈሳሾች እንደ ውሃ የፍራፍሬ ጭማቂ ወይም የላም ወተትና የዱቄት ወተት መስጠት የለበትም። □እናት ጡት ወተት ብቻ የሚጠጣ ሕፃን ጡት በከፊል ከሚጠባ ወይም በጡጦ ከሚመገብ ሕፃን በተቅማጥ፣ በሽ□ አይጠቃም።

**ለ) ንጽህናውን የጠበቀ ተጨማሪ ምግብ መስጠት፡-**

የሕፃኑ እድሜ 6 ወር ሲሆን ከእናት ጡት በተጨማሪ ምግብ መጀመር አለበት። ነገር ግን ይህ ምግብ የተመጣጠነና ንጽህናው የተጠበቀ መሆን አለበት።

**ተጨማሪ ምግቦች ምን ምን ናቸው?**

ለስላሣና የተፈጨ /የተሠለቁ/ ምግቦች፣ ከተለያዩ እህሎች የተዘጋጀ ገንፎ፣የሽሮ ፍትፍት፣ የወተት ውጤቶች፣ እንቁላል፣ ሥጋ፣ ዓሣ ፍራፍሬና አረንጓዴ አትክልቶች ተጨማሪ ምግቦች ናቸው።

**ለህፃኑ የሚሰጥ ተጨማሪ ምግብን በተመለከተ መከናወን የሚኖርባቸው ተግባሮች፡-**

- ምግብን ከማዘጋጀትና ሕፃኑን ከመመገብ በፊት እጅን በሣሙና እና በውኃ መታጠብ፣
- ምግብን በንጹህ ሥፍራ ማዘጋጀት፣
- ጥሬውን የሚበላ ምግብ ከመብላት በፊት በንጹሕ ው□ ማ□ ብ፣
- ምግብ በሚያዘጋጁበት ጊዜ ምግቡን ደህና አድርጎ ማብሰል፣
- □ዲያውኑ የተዘጋጀ ትኩስ ምግብ መመገብ፣
- የሚቆዩ ምግቦችን ሽፍኖ /ከድኖ/ በቀዝቃዛ ሥፍራ /ቢቻል በሪፍሪጅሬተር ውስጥ/ ማስቀመጥ፣
- ተቀቅሎና በስሎ ከ2 ሰዓት በላይ የቆየን ምግብ ለሕፃኑ ከመመገብ በፊት እስኪፈላ ድረስ ማሞቅ፣
- ሕፃኑን በን□ህ ማንኪያ መመገብ /ጡጦን ማስወገድ/፣



**ሐ) እጅን በንፁሕ ውኃ በሚገባ መታጠብ የተቅማጥ በሽታዎች ለመከላከል ይረዳል**

በዓሩ ሁኔታ □ □ጅን መታጠብ ማለት፣ በሣሙናና በበቂ ንጹህ □-ኃ በመጠቀም የእጃችንን ክፍሎች በሙሉ በጥንቃቄ ደሀና አድርጎ ማጠብ ማለት ነው። ስለ እጅ መታጠብ ጠቃሚነት ለእናት ወይም ለአሳዳጊ ምክር ሲሰጣት እጆችዎን መታጠብ የሚኖርባት አስፈላጊ ጊዜዎች መቼ መቼ እንደሆኑ በመዘርዘር መሆን አለበት። እነሱም፡-

- ዓይነምድር የወጣውን ሕፃን ከአፀዳችና ዓይነምድሩንም በአግባቡ ጠርጋ ከአስወገደች በኋላ
- በመ□□ጽ ቤት ውስጥ ከተፀዳዳች በኋላ
- ምግብ ከመቀቀልና ከማዘጋጀት በፊት
- ምግብ ከመብላት በፊት
- ሕፃኑን ከመመገብ በፊት

በተጨማሪም ህፃኑ ራሱ የሚመገብ ከሆነ ምግብ ከመመገቡ በፊት እጁን እንዲታጠብ ማድረግ ያስፈልጋል።

**መ) በመጸዳጃ ቤት መጠቀም**

በመጸዳጃ ቤት መጠቀም የተቅማጥ በሽታዎችን ለመከላከል ቁልፍ መንገድ ነው። እያንዳንዱ ቤተሰብ አንድ መጸዳጃ ቤት ሊኖረው ይገባል። ማንኛውም የቤተሰብ አባል በመጸዳጃ ቤት መጠቀምን □ለ□ዊ ተ□ባሩ እንዲያደርገው፣ የሚኖርበትን አካባቢ ከዓይነ ምድር የፀዳ እንዲሆንና ሕፃናት በሚጫወቱባቸው ቦታዎች ለበሽታ እንዳይጋለጡ የበኩልን ጥረት ማድረግ ይገባል። የሕፃናትንም ዓይነምድር ሁል ጊዜ በአግባቡ ማስወገድ ይገባል።

**ሠ) የሕፃናትን ዓይነምድር በአግባቡ ማስወገድ፡-**

- የሕፃናትን ዓይነምድር በፍጥነት ጠርጎ በአግባቡ ማስ□□□፣
- ዓይነምድሩን ጠርጎ በመጸዳጃ ቤት ጉድጃድ መክተት

ረ) የኩፍኝ በሽታ መከላከያ ክትባት በትክክለኛ □□□- መስጠት

እያንዳንዱ ሕፃን ቢቻል በ9 ወር ዕድሜው ወይም ከዚያም በኋላ ወዲያውኑ የኩፍኝ በሽታ መከላከያ ክትባት በመክተብ ከኩፍኝ ጋር ተያይዞ የሚመጣውን የተቅማጥ በሽ□ ለመከላከል ይቻላል።

3.3. ትኩሳት

አንድ ህፃን ትኩሳት አለው የምንለው □□ም በአሁኑ ሕመሙ ጊዜ ትኩሳት ነበረው ከተባለ፣ የህፃኑ ሰውነት ከተለመደው በላይ የሚሞቅ ከሆነ ወይም ሙቀቱ ተለክቶ 37.5 ዲግሪ ሴንቲግራድ ወይም በላይ ከሆነ ነው። በህፃናት ላይ ትኩሳት የሚያመጡ በሽታዎች በርካታ ሲሆኑ ዋና ዋዎቹ ወባ፣ኩፍኝ የጆሮ ሕመም፣የሰውነት መቁሰል ጉንፋነ፣የሳንባ ምች ወዘተ. ናቸው።

ሀ) □□

□□ ግለሰብም □□ም በሚባሉ □□ራሳይቶች የሚመጣ በሽ□ ሲሆን የሚተላለፈውም በወባ ትንኝ አማካይነት ነው።፣፣ ላ□ሞ□□ም □□ልሲ□ራም (Plasmodium Falciparum) የሚባለው የወባ ዝርያ አደገኛ ወባ የሚያመጣ ስለሆነ በዚህ ፅሁፍ ውስጥ ትኩረት የምናደርገው በሱ ላይ ይሆናል። ትኩሳት ዋነኛ □□□ በሽታ ምልክት ነው። ትኩሳቱም ሄድ መጣ የሚል ወይም ሁልጊዜ የሚኖር ሲሆን ይችላል። ከዚህ በተፊ ማሪ □□□ በሽታ ምልክቶች ማንቀጥቀጥ ማላብ እና ማስታወክ ናቸው። በሽታው ትንሽ ከቆየ አብዛኛውን ጊዜ የደም ማነስ ያስከትላል። ከዚያም በላይ እራስን አስቶ እስከ ሞት ያደርሳል። የወባ በሽታ ምልክቶች ከሌላ በሽታ ምልክቶች ጋር የመመሳሰል ፀባይ ይኖራቸዋል። ለምሳሌ ሳል □□ም ተቅማጥ በ□□ በሽታ ምክንያት ሊመጣ ይችላል። ወባ የያዘው ልጅ ቶሎ ሕክምና ካልተሰጠው በ24 ሰዓት □-ስዓ በሽታው ሊብስበትና አደገኛ ወይም ከባድ ወባ በሽ□ ሊሆንበት ይችላል። ይህም ማለት በአጭር ጊዜ ውስጥ የአንጎል ወባ ወይም ከፍተኛ የሆነ የደም ማነስ ሊከሰት ይችላል። ይህ ዓይነት ወባ የያዘው በሽተኛ በአስቸኳይ ህክምና ካልተሰጠው ቶሎ ሊሞት ይችላል።

ስለዚህ አንድ ህፃን ትኩሣት ይዞት በሚመጣበት ጊዜ በቅድሚያ ማወቅ ያለብን ልጁ የመጣው ከወባማ አካባቢ መሆኑን ወይም በወባማ አካባቢ የማይኖር ከሆነ ባለፈው 2 ሳምንት ውስጥ ወባማ ወደ ሆነ ቦታ ሄዶ የሚያውቅ ከሆነ □□ባ በሽታን በከፍተኛ ሁኔታ መጠርጠርና የትኩሣቱ መንስኤ ወባ መሆን አለበት ብሎ በማሰብ በመመሪያው መሰረት ቶሎ ሕክምና እንዲያገኝ ማድረግ ያስፈልጋል።

ትኩሣት ያለውን ሕፃን የበሽታውን ሁኔታ እንደሚከተለው መለየት ይቻላል።

**በወባ የመጠቃት ዕድል ከፍተኛ በሚሆንበት ጊዜ (High Malaria Risk)**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• ከአጠቃላይ አደገኛ ምልክቶች አንዱ ካለ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ም</li> <li>• የተገተረ ማጅራት <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ም</li> <li>• ጸበ <input type="checkbox"/> እርግብግቢት (ከአንድ አመት በታች ላሉ) ካለው</li> </ul>	<p><b>በጣም ከባድ የትኩሳት ስሜት</b> Very severe febrile disease</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ጡት ማጥባቷን የበለጠ እንድትቀጥል ንገሪያት</li> <li>• ህፃኑ ራፈራል እንደሚያስፈልገው ለእናቱ አስረጂያት</li> <li>• ህጻኑን በፍጥነት ወደ ጤና ጣቢያ/ሆስፒታል ላኪ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ትኩሳት ካለው</li> <li>• (እናቱ አተኩሶት ነበር ካለች ወይም የሚሞቅ ከሆነ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ም ሙቀቱ <math>\geq 37.5</math> <input type="checkbox"/> ሲ.ሴ)</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/> <b>Malaria</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• እናትዎን ስለ ህፃኑ አመጋገብ እና ፈላሽ አወሳሰድ ምክሪያት</li> <li>• እናት ህጻኑን በፍጥነት ይዞ መሄ <input type="checkbox"/> እንዳለባት አስተምረያት</li> <li>• ትኩሳቱ ካልበረደ የትኩሳት መድኃኒት በመስጠት ተመልሳ ወደ ጠየና ድርጅት መሄድ እንዳለባት ንገሪያት</li> <li>• የወባ አጎበር አጠቃቀምን ለእናት አስተምሪ</li> </ul>

**በወባ የመጣቃት ዕድል ዝቅተኛ በሚሆንበት ጊዜ (low Malaria Risk)**

ምልክቶች	ስጸሜ	ህክምና
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ከአጠቃላይ አደገኛ ምልክቶች አንዱ ካለ <input type="checkbox"/> ም</li> <li>• የተገተረ ማጅራት <input type="checkbox"/> ም</li> <li>• ጸበ <input type="checkbox"/> እርግብግቢት ካለ <input type="checkbox"/></li> </ul>	<p><b>በጣም ከባድ የትኩሳት በሽታ</b>  <b>Very severe febrile disease</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ጡት ማጥባቷን የበለጠ እንድትቀጥል ንገሪያት</li> <li>• ህፃኑ ራፈራል እንደሚያስፈልገው ለእናቱ አስረጃይት</li> <li>• ህጻኑን በፍጥነት ወደ ጤና ጣቢያ/ሆስፒታል ላኪ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ጉንፋን፣ ውሃማ ንፍጥ የሌለው እና</li> <li>• ኩፍኝ የሌለው እና</li> <li>• ትኩሳት የሚያመጣ ሌላ ህመም <input type="checkbox"/> ሌለ <input type="checkbox"/> ከሆነ</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/> <b>Malaria</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• እናትዋን ስለ ህፃኑ አመጋገብ እና ፈሳሽ አወሳሰድ ምክሪያት</li> <li>• እናት ህጻኑን በፍጥነት ይዞ መመለስ ያለባት ምን ሲሆን እንደሆነ ንገሪያት</li> <li>• ትኩሳቱ ካልበረደ ወደ ጤና ድርጅት ላኪ <input type="checkbox"/></li> <li>• የወባ አጎበር አጠቃቀምን ለእናት አስተምሪያት</li> <li>• የትኩሳት መድኃኒት መስጠት</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• ውሃማ ንፍጥ ያለበት/ጉንፋን የያዘው ከሆነ ወይም</li> <li>• ኩፍኝ የያዘው ወይም</li> <li>• ትኩሳቱ በሌላ <input type="checkbox"/>ል<input type="checkbox"/> በሽ<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>ተከሰተ ከሆነ</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/>ባ <input type="checkbox"/>ግ<input type="checkbox"/>መስል ትኩሳት  <b>Fever malaria unlikely</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• እናትየዋን ስለ ህፃኑ አመጋገብ እና ፈሳሽ አወሳሰድ ምክሪያት</li> <li>• እናት ህጻኑን በፍጥነት ይዛ መሄ<input type="checkbox"/> ያለባት ምን ሲሆን እንደሆነ ንገሪያት</li> <li>• ትኩሳቱ ካልበረደ ወደ ጤና ድርጅት ላኪው</li> <li>• የወባ አጎበር አጠቃቀምን ለእናት አስተምሪያት</li> <li>• የትኩሳት መድኃኒት መስጠት</li> </ul>
--	---	---

**በወባ የመጠቃት ዕድል በማይኖርበት ሁኔታ (No Malaria Risk)**

ምልክቶች	ስጹሜ	ህክምና
<p>ከአጠቃላይ አደገኛ ምልክቶች አንዱ ካለው ወይም</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>የተገተረ ማጅራት <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ም</li> <li>ጸበ <input type="checkbox"/> እርግብግቢት ካለ <input type="checkbox"/>.</li> </ul>	<p>በጣም ከባድ የትኩሳት በሽታ <b>Very severe febrile disease</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ጡት ማጥባታን የበለጠ እንድትቀጥል ንገሪያት</li> <li>ህጻኑን በፍጥነት ወደ ጤና ጣቢያ ላኪ <input type="checkbox"/>.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ትኩሳት</li> </ul>	<p>ትኩሳት /ወባ የሌለው/ Fever (no malaria)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>እናትየዋን ስለ ህፃኑ አመጋገብ እና ፈሳሽ አወሳሰድ ምክሪያት</li> <li>እናት ህጻኑን በፍጥነት ይዞ መሄ <input type="checkbox"/> ያለባት ምን ሲሆን እንደሆነ ንገሪያት</li> <li>ትኩሳቱ ካልበረደ ወደ ጤና ድርጅት ላኪው</li> <li>የወባ አጎበር አጠቃቀምን ለእናት አስተምሪያት</li> <li>የትኩሳት መድኃኒት መስጠት</li> </ul>

**ማሳሰቢያ**

- በሽታው ዓይነት በጣም ከባድ የትኩሳት በሽታ (very sever febrile disease) ከሆነ ሕፃኑን በአስቸኳይ ወደሚቀጥለው የጤና ድርጅት መላክ አለበት::
- ወባ ከሆነ ግን የወባ መድኃኒት አሰጣጥን በተመለከተ የወባ በሽታ መከላከያና መቆጣጠሪያ መመሪያን ይመልከቱ:::

**የወባ መከላከያ ዘዴዎች**

- ሁልጊዜ በመድሐኒት የተነከረ የአልጋ አጎበር □-ስዓ መተኛት በወባ ትንኝ እንዳይነከሱ ስለሚያደርግ የወባ በሽታን ለመከላከል በጣም ይጠቅማል፤
- የወባ ትንኝ መራቢያ የሆኑ ውኃዎችንና ኩራዎች ማስ□□□፤
- ሰዎች ወደ ወባማ ቦታ ከመሄዳቸው በፊት መከላከያ ክኒን ጀምረው መሄድና በሚቆዩበት ሰዓትና ከተመለሱ በኋላ የወባ መከላከያ ኪኒን መውሰድ ወባን ለመከላከል □ረ□ል።

*ለበለ□ መረጽ □□ባ በሽታ መከላከያና መቆጣጠሪያ መመሪያን ይመልከቱ።*

**ለ) ኩፍኝ /አንከሊስ/**

ኩፍኝ ወይም አንከሊስ በሚዝልስ ቫይረስ አማካይነት የሚመጣ ሲሆን በከፍተኛ □ረጽ ከሰው ወደ ሰው □ሚተላለ□ በሽታ ነው።

ህፃናት በማህፀን ውስጥ ከእናታቸው የሚያገኙት ፀረ-ኩፍኝ የሆነ ንጥረ ነገር እስከ ስድስት ወር ዕድሜ ድረስ ኩፍኝ እንዳይዛቸው ሊከላከልላቸው ይችላል። ኩፍኝ የሰውነታችንን በሽታ የመከላከል ኃይል በመቀነስ ለሌላ በሽታዎች አጋልጦ ይሰጣል። በዚህም ምክንያት 30 ከመቶ የሚሆኑ ኩፍኝ የያዛቸው ልጆች

- ✦ ተቅማዓ
- ✦ የሳምባ ምች
- ✦ የአፍ መቁሰል
- ✦ □□ሮ እንፌክሽን
- ✦ ከባድ የዓይን እንፌክሽን እስከ ዓይነሥውርነት የሚደርስ የጤና ችግርና ከባድ የምግብ እጥረት ሊያጋጥማቸው ይችላል።



**ኩፍኝ እንዴት ይታወቃል?**

አንድ ህፃን ትኩሣት በጀመረው ከሦስት እስከ አምስት ቀን ባለ□ □ □-ሰዓ ቀ □ ትንንሽ ሽፍታ ከጭንቅላቱ ጀምሮ በሰውነቱ ላይ ግልብጥ ብሎ ወጥቶ የሚታይ ከሆነና በሽተኛው ከሚከተሉት አንዱ ሳል ወይም ከአፍንጫው ቀጭን ንፍጥ የሚወርድ ከሆነ ወይም የዓይኑ ኳስ ነጩ ክፍል ቀይ ከሆነ ልጁ ኩፍኝ ይዞታል ማለት ይቻላል። ኩፍኝ አሁን ወይም ባለፈው ሦስት ወር ውስጥ ካለው ከዚህ በሚቀጥለው ሰንጠረዥ እንደተመለከተው የበሽታውን ደረጃ መለየት ጸስ□ል□ል:-

ምልክት	በሽ□□- ሰጸሜ	ሚ□ሰ□□ □ርምጽ
<ul style="list-style-type: none"> <li>ማንኛውም የአደገኛ ህመም ምልክት ካለ □□ም</li> <li>የዓይን ብረት ነጭ ከጣለበት ወይም</li> <li>ከባድ የአፍ መቁሰል ካለ</li> </ul>	ኩፍተኛ የኩፍኝ በሽ□ severe complicated measles)	<ul style="list-style-type: none"> <li>በአስቸኳይ ወደሚቀጥለው የጤና ድርጅት መላክ</li> <li>ትኩሳቱን ማብረድ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>መግል ከዓይን የሚወጣ ከሆነ □□ም</li> <li>የአፍ መቁሰል ካለ</li> </ul>	ኩፍኝ ከዓይን ወይም ከአፍ መቁሰል ጋር (measles with eye or mouth complication) ከተከሰተ	<ul style="list-style-type: none"> <li>የህፃኑን ዓይኖች በሙቅ □-ሃ ማ□ብ</li> <li>የአፍ መቁሰል ካለ ጂ.ቪ. መቀባት</li> <li>በሁለተኛው ቀን □□ ጤና ድርጅት መላክ</li> </ul>
አሁን ወይም ባለፈው ሦስት ወራት ውስጥ ኩፍኝ ካለው ጸለ ሌላ ጠንቅ	ኩፍኝ (measles)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ቫ□ታሚን ኤ እንድትወስድ ወደ ጤና ድርጅት መላክ</li> </ul>

**ማሳሰቢያ፣**

በሽተኛው ኩፍኝ የያዘው ወይም ያለው መሆኑ ከ□□ቀ በኩፍኝ ምክንያት የሚመጡ ችግሮች መኖራቸውን ማረጋገጥ ጸስ□ል□ል። እነዚህም ከፍተኛ የሆነ የአፍ መቁሰል ካለ፣ የዓይን ብረት ነጭ ከሆነ ወይም ከፈረጠ ወይም ማንኛ□-ም የአደገኛ ሕመም ምልክት ከታየ በአስቸኳይ ወደሚቀጥለው የጤና ድርጅት መላክ ያስፈልጋል።

**የመከላከያ ዘዴዎች**

- ልጅን በወቅቱ በማስከተብ የኩፍኝ በሽታን መከላከል ይቻላል። ቢይዘው እንኳ በሽታው አይጠናቡትም።
- አንድ ልጅ ኩፍኝ ሲይዘው አካባቢው ወደአለው የጤና ተቋም መውሰድና የሕክምና አገልግሎት እንዲያገኝ በማድረግ አደገኛ የሆኑ የጤና ጠንቆችን ማስወገድ ይቻላል።
- ኩፍኝ በከፍተኛ ደረጃ ተላላፊ ስለሆነ ጎረቤት ወይም በአካባቢው በኩፍኝ የታመመ ልጅ ካለ ልጆች እንዳይገናኙ ማግለጫ ግልጽ ማድረግ ይቻላል።

**ኩፍኝ ለያዘው ህፃን የሚደረጉ ክብካቤዎች**

- ብጫ ጫ ምጫብ ጫታቸው ስለሚቀንስ የተመጣጠነ ምጫብ እንዲወስዱ ማበረታታት ያስፈልጋል፤
- ከፍተኛ ትኩሣት ካለ ማብረድ፤
- ቫቫታሚን ኤ በዕድሜው ወይም በክብደቱ አንጻር 3 ጊዜ እንዲያገኙ ማድረግ /በዕለቱ፤ በማግስቱና ሦስተኛውን በ15ኛው ቀን መስጠት/ ከኩፍኝ ተከትሎ የሚመጣውን የዓይን በሽታ እና ሌሎች የጤና ችግሮች ለመከላከል ያስችላል።

**ሐ) ጫ ሕመም**

የጫ ሕመም በአብጫኛው የሚከሰተው በጆሮ ኢንፎክሽን ምክንያት ነው። የጆሮ ኢንፎክሽን ሲኖር መግል ከጆሮ ታንቡር ጎሳ ሲጠራቀም የሕመም ስሜትና ትኩሣት ያመጣል። በወቅቱ ሕክምና ካልተደረገለት የጆሮ ታንቡር ይፈነዳና መግሉ መፍሰስ ይጀምራል። የጆሮ ኢንፎክሽን በወቅቱ ቶሎ ካልታከመ ኢንፎክሽኑ ወደ አካባቢው ያሉ አጥንቶችና ወደ አንጎል ሊዘመትና አደገኛ የሆነ በሽታ ሊያስከትል ይችላል። የጆሮ ኢንፎክሽን መስማት አለመቻል ያመጣል። በመሆኑም ከፍተኛ የሆነ የመማር ችግር ያስከትላል። ስለዚህ የጆሮ ሕመም ሲኖር ወዲያው ተገቢውን ሕክምና ማግኘት እንደሚያስፈልግ ማስተማር።

□□ሮ ሕመም ጸለቅ ልፀ ሲጸግም ማረጋገጫ  
/መመርመር/ ያለብን ነገሮች

- የጆሮ ሕመም አሁን ያለው መሆኑን
- ከጆሮው መግል እየወጣ መሆኑን
- ከጆሮው መግል □□□□ ከሆነ ስንት ቀን እንደሆነ
- ከጆሮ ግንዱ ላይ ሕመም ያለው ወይም እብጠት መኖሩን ሲሆን

በእነዚህ ምልክቶች መሠረት የችግሩን ዓይነት ከዚህ ቀጥሎ በተቀመጠው ሰንጠረዥ መሠረት መለየት ጸስጋል።

ምልክቶች	ስጸሜ	ህክምና
<ul style="list-style-type: none"> <li>ጆሮግንዱ ሕመም ያለው ዕብጠት<sup>1</sup> ካለ□.</li> </ul>	<p><b>ማስቶይዳይቲስ (Mastoiditis)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>በአስቸኳይ ወደ ጤና ድርጅት መላክ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ር□. □ግሊ.መ□ል እና መግሉ ከ14 ቀን በታች የቆየ ከሆነ ወይም</li> <li>□□ር ህመም ካለ□.</li> </ul>	<p><b>አጣዳፊ የጆሮ ኢንፌክሽን</b> Acute ear infection</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ህፃኑ ጡት እየጠባ ከሆነ እናት ማጥባቷን እንድትቀጥል ምክራያት</li> <li>ህጻኑ ወደ ጤና ጣቢያ መወሰድ እንዳለበት ለእናቱ ምክራ</li> <li>ህጻኑን ወደ ጤና ጣቢያ በፍጥነት ላኪው</li> <li>ትኩላት መድኃኒት መስጠት</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ር□. □ግሊ.መ□ል እና መግሉ 14 ቀን ወይም ከዚያ በላይ ከቆየ</li> </ul>	<p><b>የቆየ የጆሮ ኢንፌክሽን</b> Chronic ear infection</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ህፃኑ ጡት እየጠባ ከሆነ እናት ማጥባቷን እንድትቀጥል ምክራያት</li> <li>ህጻኑ ወደ ጤና ጣቢያ መሄድ እንዳለበት ለእናቱ ምክራ</li> <li>ህጻኑን ወደ ጤና ጣቢያ ላኪው</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>□□ር ህመም □ሊ.ለ□. እና</li> <li>□ር□. □ግግ□መ□ል ከሆነ</li> </ul>	<p><b>የጆሮ ኢንፌክሽን □ለ□-ም</b> No ear infection</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ህክምና አያስፈልገውም</li> <li>ምክር ብቻ መስጠት</li> </ul>

<sup>1</sup> ህመም ያለው የጆሮ ግንድ እብጠት የሚባለው ከጆሮ በስተኋላ ያለው የጭንቅላት ክፍል እብጠት ሲኖረውና ሲነኩት የህመም [ስሜት](#) የሚያስከትል ሲሆን ነው::

"ማስቶይይይቲስ" ወይም ያልቆየ የጆሮ በጀርም መበከል መኖሩን ካረጋገጥን በአስቸኳይ ወደሚቀጥለው የሕክምና ተቋም በሽተኛውን መላክ አለብን።

**ማሳሰቢያ**

ማስቶይይይቲስ የጆሮ ግንድ ብክለት ያለው ልጅ የጀርም ብክለቱ ወደ አንጎሉ ሊዛመትና የማጅራት ገትር በሽታ ሊያመጣ ስለሚችል በአስቸኳይ ተገቢውን ሕክምና ወደሚያገኝበት የጤና ድርጅት መላክ አለበት።

**የጆሮ መግል አጠራረግ ዘዴ**

የቆየ የጆሮ ኢንፌክሽን ካለ መግሉ እስኪደርቅ ድረስ በደረቅ ንፁህ የጥጥ ጨርቅ/ሻሽ መጥረግ ያስፈልጋል። በትንሹ የተቆራረጠ ንፁህ ጨርቅ በቀጭኑ አሸምልሙሎ ጆሮ ውስጥ አሥገብቶ መግሉን እንዲመጠው ትንሽ አቆይቶ ማውጣት። በዚህ ዓይነት መግሉ እስኪደርቅ ድረስ በየቀኑ ቢያንስ ከሁለት እስከ ሦስት ጊዜ መጥረግ።

□ር□. □ታመመ ህፃን መድኃኒቱን እየወሰደ በአምሥተኛ□. ቀን ክትትል ማድረግ ያስፈልጋል። በዚህ ወቅት በአጠቃላይ □□ተሻለው መሆኑን፣ የጆሮ ህመምና ትኩሣቱ መቀነሱን መግሉ መድረቁን፣ ማረጋገጥ ያስፈልጋል። የጆሮ ህመምና ትኩሣቱ ከቀነሰ፣ መግሉ ከደረቀ በአጠቃላይ ከተሻለው ክብካቤውን እንዲቀጥሉ መምከር የሚያስፈልግ ሲሆን ከዚህ በተለየ ሁኔታ እነዚህ ምልክቶች ካልቀነሱና በአጠቃላይ ካልተሻለው ወደሚቀጥለው የጤና ድርጅት በአስቸኳይ መላክ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው ተግባር ነው።

**3.4. የምግብ እጥረት እና የደም ማነስ የምግብ ዕጥረት**

□ተመጣጠነ ምግብ ዕጥረት አለ የምንለው አንድ ህጻን ለዕድሜው አስፈላጊ የሆኑ ሰውነት ገንቢ፣ □□ል ሰጭና በሽታን የሚከላከሉ ምግቦች በተመጣጠነና በበቂ ሁኔታ ሳያገኝ ሲቀር ነው።

ማንኛውም ልጅ ወደ ጤና ድርጅት ለተለያዩ አገልግሎቶች ሲመጡ ወይም የጤና ኤክስቴንሽን ሠራተኞች ጤና ባለሙያዎች ቤት ለቤት ጉብኝት ሲያደርጉ የምግብ ዕጥረትና የደም ማነስ ምልክት እንዳለበት መታዩት አለበት።

ህጻን/ኗ በምግብ ውስጥ በቂ ቫይታሚን የማያገኝ ከሆነ/ች በቫታሚን ዕጥረት ሊከሰት ይችላል። በቫታሚን ኤ ዕጥረት ያለው ልጅ በኩፍኝ፣ በተቅማጥና በሳምባ ምች የመሞት ዕድሉ ከፍተኛ ነው። ዓይነስውር የመሆን ዕድሉም ከፍተኛ ነው።

ግምብ ክጥረት የሚከሰተው በቤተሰቡ የምግብ አቅርቦት ዕጥረት ወይም አቅርቦቱ እያለ በሚፈለገው መጠንና ዓይነት መመገብ ባለመቻል ሊከሰት ይችላል።

ግምብ እጥረት በሽታ መኖሩን ማጣራትና ደረጃውን ማወቅ መሠረታዊ የህጻናትን የጤና አገልግሎቶችን ወደ ታች ወደ ማህበረሰብና ወደ ቤተሰብ የማድረስ ሥራ ሲከናወን ትኩረት ተሰጥቶ መከናወን ከሚገባቸው አንዱ ህጻናት የምግብ ዕጥረት ያለባቸው መሆኑን በተከታታይ ማጣራትና መከታተል ነው።

ከዚህ በታች ያለው ሠንጠረዥ ግምብ እጥረት በሽታ መኖሩን ለማጣራትና ደረጃውን ለማወቅና የምንወስደውን ርዕዮተኛ ለመቆም ርቀል ።

ምልክቶች	ግራም (ብሽግ ግራም ስጸሜ)	ግራም ስጸሜ ግራም
<ul style="list-style-type: none"> <li>• እስከ 6 ወር ዕድሜ ላሉ             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ግራም ከባድ የሆነ የሰውነት መክላት ግራም                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ሁለቱም ግራም ያበጠ ከሆነ</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• እድሜው 6 ወርና ከዛ በላይ ለሆነ             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ለግራም ክንዳ አማካይ ዙሪያ ከ 11 ሳ.ሜ በታች ወይም ሁለቱም ግራም ያበጠ ከሆነ</li> </ul> </li> </ul>	<p>ከባድ የምግብ እጥረት በሽታ (Severe malnutrition)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ቫግታሚን ኤ መወሰዱን አረጋግጧል</li> <li>• ለእናት ህጻኑን ወደ ጤና ጣቢያ መውሰድ እንደሚያስፈልገው አስረጁያት</li> <li>• ግራም ስጸሜ ታልፎ፣ ጤና ድርጅት ወይም በህብረተሰቡ ውስጥ በምግብ እጥረት የተጎዱ ማገገሚያ ጣቢያ በፍጥነት ላኪው</li> <li>• እናት የዋን ልጅዋን ወደ ጤና ጣቢያ ወይም ማገገሚያ ጣቢያ እስክትደርስ ቶሎ ቶሎ እንድታጠባውና እንድትመገቡ ምክራያት</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ለግራም በግም ግራም የሆነ ክብደት</li> </ul>	<p>በግም ግራም ክብደት (Very low weight)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• የህፃኑን የአመጋገብ ሁኔታ መርምሮ፣ በአመጋገብ ምክር ቻርት ውስጥ ባለው መሰረት እንድትመገቡ ለእናት ምክራ</li> <li>- የአመጋገብ ችግር ካለው በ5ኛው ቀን እንዲመለስ ቅጠረው</li> <li>- የአመጋገብ ችግር ከሌለው በ 30ኛው ቀን እንዲመለስ ቅጠረው</li> <li>• ለኤች አይ ቪ ኢንፌክሽን ወደ ጤና ጣቢያ ላኪው</li> <li>• ምን ስታይ በፍጥነት ቀጠሮዋን ሳትጠብቅ የምትመለሰው ምን ሲሆን እንደሆነ ለእናት ምክራያት</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ግራም ስጸሜ በግም ግራም የሆነ ክብደት ያልሆነ እና የምግብ እጥረት ምልክት ሌለው</li> </ul>	<p>በግም ግራም ያልሆነ ክብደት (Not very low weight)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ስጻኑ ከሁለት ዓመት በታች ከሆነ የአመጋገብ ሁኔታውን በመመርመር እናትን ስለ ህጻን አመጋገብ ምክራ</li> <li>• የአመጋገብ ችግር ካለው በ5ኛው ቀን እንዲመለስ ቅጠረው</li> <li>• በፍጥነት ቀጠሮዋን ሳትጠብቅ የምትመለሰው ምን ሲሆን እንደሆነ አስተምራያት</li> </ul>

ከፍተኛ የሆነ የምግብ እጥረት ያለው ልጅ በሳምባ ምች፣ በተቆማጥ፣ በኩፍኝ ወይም በሌሎች በሽታዎች የመሞት ክብሉ እጅግ ከፍተኛ ስለሆነ በአስቸኳይ ወደ ጤና ቤቅ ለክትትልና ለተገቢው ሕክምና መላክ አለበት።

**ለ) የደም ማነስ ( Anaemia)**

የደም ማነስ ምክንያቶች ብዙ ሊሆኑ ቢችሉም በታዳጊ ሀገሮች ያሉ ህፃናት ዋነኛ የደም ማነስ ምክንያት በቂ የብረት ማዕድን ያለው ምግብ ህፃናትን አለለመገብ ነው ። በተለጸጉ በሽታዎች መጸ። ዓፍ ትላትል መኖርና ወባ በሽታ ሌሎች ዋነኛ የህጻናት የደም ማነስ መንስዔዎች ናቸው ። የደም ማነስ ማለት ቀይ የደም ህዋሶች ቁጥር ሲያንስ ወይም በቀይ የደም ሕዋሶች ውስጥ ያለው ብረት/ አይረን/ ሲያንስ ነው ።



ምልክቶች	<p style="text-align: center;"><b>□ረጽ</b> (□በሽ□□- ስጸሜ)</p>	<p style="text-align: center;"><b>□ሚ□ሰ□□- □ርምጃ ሕፃኑን</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• በ□ም □□□ መ□□</li> </ul>	<p><b>ከባድ የደም ማነስ</b> Severe anaemia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ወደ ጤና ጣቢያ መውሰድ እንደሚገባት አስረጂአት በ□ም አስፈላጊ እንደሆነ አስረጂያት</li> <li>• ህፃኑን በፍጥነት ወደ ጤና ጣቢያ ላኪው</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• በመጠኑ የገረጣ መጻፍ</li> </ul>	<p><b>የደም ማነስ</b> Anaemia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ለእናት ህጻኑን ወደ ጤና ጣቢያ መውሰድ እንደሚገባት አስረጂያት ረ□ራል እንደሚያስፈልገው አስረጂያት</li> <li>• ወደ ጤና ጣቢያ ላኪው</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ጸልጊ□ መ□□</li> </ul>	<p><b>የደም ማነስ የሌለው</b> No anaemia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ሕጻኑ ከሁለት ዓመት በታች ከሆነ የአመጋገብ ሁኔታውን በመመርመር በአመጋገብ ምክር ቻርት ውስጥ ባለው መመሪያ መሠረት እንድትመግቡ ለእናት ምክሪ             <ul style="list-style-type: none"> <li>- የአመጋገብ ችግር ካለው በ5ኛው ቀን እንዲመለስ ቅጠሪው</li> <li>- ቀጠሮዋን ላትጠብቅ በፍጥነት የምትመለሰው ምን ስ□□ እንደሆነ እናትን ምክሪ</li> </ul> </li> </ul>

**የምግብ ዕጥረትና ደም ማነስ መከላከያ ዘዴዎች፡-**

□ም□ብ እጥረት እንዲከሰት ህፃናት ሲወለዱ ጀምሮ የእናት ጡት በሚገባ እንዲጠቡ ማድረግ እንዲሁም ከ6 □ር ክ□ሜ በኋላ ተመጣጣኝ ተጨማሪ ምግብ እንዲጀምሩ ወላጆችን ወይም አሳዳጊዎችን በመምከር መከላከል ይቻላል።

ህፃኑ የተመጣጠነ ምግብ እንዲያገኝ ከተደረገ ጤነኛ ሆኖ ስለሚጸ□□ በእንጫካሽን ምክንያት የሚመጣውን የደም ማነስ መከላከል ይቻላል። የተመጣጠነ ምግብ ልጆች ከተመገቡ አስፈላጊውን ማዕድን ጭምር ስለሚያገኙ በብረት/አይረን/እጥረት ምክንያት የሚመጣውን የደም ማነስ መከላከል ይቻላል።

በወባማ አካባቢ መድሐኒት የተነከረ የአልጋ አጎበር ውስጥ በመተኛት በወባ ምክንያት የሚመጣው የደም ማነስ መከላከል ይቻላል።

**የሕፃኑን አመጋገብ መጠየቅ**

- አንድ ህፃን የደም ማነስ ካለው ወይም ክብደቱ ከሚጠበቀው በታች በጣም ዝቅተኛ ከሆነ ወይም

- ዕድሜው ከሁለት ዓመት በታች ከሆነ ከዚህ በታች በተመለከተው መሠረት የሕፃኑን ዓመጋገብ መጠየቅና ማወቅ እንዲሁም አስፈላጊውን ምክር መስጠት ይጠቅማል። ስለሕፃኑ አመጋገብ ጠይቀን የምናገኘውን መረጃ በሕፃናት የአመጋገብ ሠንጠረዥ ላይ ካለው መውሰድ ስለሚገባቸው ርምጃዎች ጋር በማነፃፀር የአመጋገብ ችግር ካለ ለማስተካከል መምከር፣ አመጋገቡ ትክክል ሆኖ ከተገኘ እናቱ ወይም አሳዳጊው ለሠራቸው ጥሩ ስራ ማመስገንና እንዲቀጥልበት ማበረታታት ያስፈልጋል።

**የምክር አገልግሎት ሲሰጥ የምንጠቀምበት ጥሩ ስራ ባቢያ ክህሎት**

እናት ወይም አሳዳጊ በምንመክርበት ጊዜ የሚከተሉትን ስራ ባቢያ ክህሎቶች መጠቀም በጣም ጠቃሚ ነው።

**መጠየቅና ማዳመጥ**

ስለአመጋገቡ ከጠየቅን በኋላ እናቱ ምን እያደረገች እንደሆነ ለመረዳት በደንብ ማዳመጥ አለብን። በደንብ ካዳመጥን እናቱ ምን በትክክል እየሠራች እንደሆነና የቱ ደግሞ መስተካከል እንዳለበት እናውቃለን።

**ማመስገን /ማበረታታት**

እናት ምን ጊዜም ለልጇ የምታደርገው ጥሩ ነገር ይኖራል። ለምሳሌ ጡት እያጠባች ይሆናል። ጡት ማጥባት በራሱ ለህፃኑ በጣም ጥሩ ተግባር ነው። ስለዚህ እናቱ ለህፃኑ የሚጠቅም ነገር በማድረግ ማመስገን ይኖርብናል። ነገር ግን የምናመስግናት በትክክል ለሠራችው ሥራ መሆን አለበት።

**መምከር**

ለእናትየዋ የሚሰጠው ምክር አግባብ ያለው ብቻ መሆን አለበት። እናትየዋ ልትረዳው በምትችለው ቀላል ቋንቋ መጠቀም ይገባል። ከተቻለ ሥዕሎች ወይም የትምህርት መርጃ መሣሪያዎች ለማስረዳት እንዲረዳን መጠቀም ጥሩ ይሆናል።

ጎጂ የአመጋገብ ልምዶችን ለማስቀረት ወይም ለማስተካከል መምከር ያስፈልጋል። ጎጂ የአመጋገብ ልምዶችን ለማስተካከል በምንመክርበት ጊዜ በጣም ግልጽ በሆነ መንገድ እና እናትየዋ በሚገባት ሁኔታ መሆን አለበት። ነገር ግን እናትየዋ ያንን በማድረግ በጣም እንዳታዝን ወይም ከመጠን ያለፈ ፀፀት እንዳይሰማት መጠንቀቅ ያስፈልጋል።

**ምርቱን በደንብ መረዳቷን ማረጋገጥ**

እናትየዋ ወይም አሳዳጊዋን ከማሰናበታችን በፊት የተሰጠውን ምክር በደንብ መረዳቷን ለማወቅና ተጨማሪ ማብራሪያ የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች እንዳሉም ለማወቅ መጠየቅ ያስፈልጋል። በምንጠይቅበት ጊዜ ወደ መልሱ የሚያመራን

ወይም በቀላሉ አዎ ወይም አይደለም በማለት የሚመለሱ ጥያቄዎች ማስወገድ ያስፈልጋል። ለምሳሌ አሁን በተነጋገርነው መሠረት ነው ከአሁን በኋላ ልጅሽን የምትመግቧው ብንል አዎ ልትል ትችላላች። ነገር ግን በትክክል መረዳቷን ለማወቅ አይቻልም። ስለዚህ ጥሩ ዓጾቁ አይደለም። ነገር ግን እስቲ ከአሁን በኋላ ልጅሽን እንዴት አድርገሽ እንደምትመግቧው "ንገሪኝ? ብለን ከጠየቅን በዝርዝር እንድትነግረን ዕድል ስለሚሰጣት በትክክል ካወቀች አመስግነን እናሰናብታታለን። ትክክል ያልሆነ ነገር ካለ እንደገና ለመምከር እድል ይሰጠናል።

**የአመጋገብ ችግር ከመድረሱ በፊት ስለ አመጋገቡ መመካከር እጅግ ጠቃሚ ነው።**

የአንድ ህፃን አመጋገብ በተገቢው ሁኔታ መሆን አለመሆኑን ለማወቅ ከዚህ ቀጥሎ ያሉትን ጥያቄዎች መ□□ቅ □□ባል።

**ስለ አመጋገብ የሚጠየቁ ጥያቄዎች**

- ልጅሽን ጡት □□ቢሻለሽ? -----
  - አዎ ከሆነ መልሱ በ24 ሰዓት ስንት ጊዜ? \_\_\_\_\_
  - ሌሊትም ጡት □□ቢጸለሽ? -----
- ህፃኑ ሌላ ፈሳሽ ወይም ምግብ ይወስዳል? -----
  - ምን ዓይነት ምግብ ወይም ፈሳሽ?
  - በቀን ስንት ጊዜ ይሰጠዋል? -----
  - ለህፃኑ ምግቡን በምን ትሰጭዋለሽ? -----
- ክብደቱ ከሚጠበቀው በታች በጣም ዝቅተኛ ከሆነ፡- ምን ያህል ምግብ እንደሚሰጠ□. መ□□ቅ? -----
  - ህፃኑ ምግቡን ለብቻው ነው የሚቀርብለት? -----
  - ህፃኑን ማን ነው የሚመግበው ? \_\_\_\_\_
  - እንዴት ነው የሚመገበው ? \_\_\_\_\_
- በአሁኑ ሀመም ጊዜ የሕፃኑ አመጋገብ ተለውጧል? አዎ ከሆነ እንዴት ብሎ እንዲያብራሩ ማ□□ረ□።: \_\_\_\_\_

ይህን መረጃ ከአገኝን በኋላ የአመጋገብ ችግሮችን ለይቶ መዘርዘር ያስፈልጋል። ችግሮቹን ለመለየት ያገኘውን የሕፃኑን የአመጋገብ መረጃ ከሕፃናት አመጋገብ ሪከመንዴሽን ሰንጠረዥ ጋር ማነፃፀር ያስፈልጋል። ለምሳሌ አንድ ሕፃን በተወሰነ የእድሜ ክልል ምን ምን መመገብ እንዳለበት፣ በቀን ስንት ጊዜ መመገብ እንዳለበት ማወቅ ይገባል። ከዚያ ለተገኙት አመጋገብ ችግሮች የአመጋገብ ሰንጠረዥ በሚያመለክተው መሠረት እናቱ ወይም አሳዳጊው እንድትመግበው መምከር ወይም ካውንስል ማድረግ ያስፈልጋል። የአመጋገብ ሠንጠረዥን በተያያዘው ዕዝል ይመልከቱ። የምንሰጠው ምክር እናቱ ልግግግ የምትችለውንና በቤት ውስጥ ያለውን ሁኔታ በማገናዘብ መሆን አለበት።

**ቫቫታሚን ኤ**

የተመጣጠነ የምግብ እጥረት በሚከሰትበትና ከፍኝ በሚይዝበት ጊዜ በሕፃኑ ሰውነት ውስጥ ከፍተኛ ቫቫታሚን ኤ እጥረት ይኖራል። የቫቫታሚን ኤ እጥረት ለዓይነ ስውርነትና ለከፍተኛ የጤና ችግር ይዳርጋል። በቂ ቫቫታሚን ኤ የሚያገኝ ልጅ በሽታ የመከላከል ብቃቱ የተሻለ ነግሶ። ቫቫታሚን ኤ ለሕፃናት በመስጠት ብቻ የሕፃናትን ሞት ከመቶ ሃያ እጅ መቀነስ ይቻላል። ስለዚህ ማንኛውም ሕፃን ከዘጠኝ ወር እስከ አምስት ዓመት እድሜ ድረስ በየስድስት ግሩ ቫቫታሚን ኤ ማግኘት እንዲቻል ወደ ጤና ድርጅት መላክ፣ ሕጻኑን መከተል ጸስቶ ለሌሎች ለሽታዎች

**3.5. በህፃናት ላይ የሚታዩ ሌሎች በሽታዎች**

- ሀ) የጉሮሮ ሕመም ያለበት ሕጻን
  - ትኩሳት ይኖረዋል
  - የአንገት ዕጢዎች ሊያብጡ ይችላሉ
  - ጉሮሮው ሲታይ እብጠት መቅላትና መግል መያዝ ሊታይበት ይችላል
  - መመገብ ያስቸግረዋል።

የጉሮሮ ሕመም ለያዘው ሕጻን የሚደረግ ክብካቤ

- ❖ ሞቅ ያለ ፈሳሽ በርከት አድርጎ መስጠት፤
- ❖ በቂ ዕረፍት እንዲያገኝ ማድረግ፤
- ❖ መመገብ ካስቸገረው፤ ከፍተኛ ትኩሳት ካለው ወይም  
 ሲታይ መግል ከያዘ ወደ ሚቀጥለው የጤና ድርጅት መላክ ያስፈልጋል።

**ለ) የዓይን ማዘ (ትራኮማ)**

የዓይን ማዘ በተለያዩ ጀርሞች ምክንያት የሚመጣ በሽታ ሲሆን የሚተላለፈውም ከታመመ ህፃን/ሰው ወደ ጤነኛ ህፃን በዝንብ፤ ፎጣንና ተመሳሳይ ልብስ/ጨርቅ ለህፃናት ፊት ማጽጃ በጋራ በመጠቀም ነው። ምልክቶቹም የዓይን መቅላትና ማቃጠል፤ አንዳንዴም መግል የሚመስል ፈሳሽ መውጣት፤ የዓይን ፀጉር መጣበቅና አይን አለመከፈት፤ የአይን ሽፋን ማበጥ ወዘተ. ናቸው።

የዓይን ማዘ ለያዘው ህፃን የሚደረግ እንክብካቤ

- ዓይኑን በሳምና በ□-ሃ ማ□-ብ፤
- ወደ ጤና ድርጅት እንዲሄድ በመምከር የፀረ-ተዋህሳን የዓይን ቅባት እንዲወስድ ማድረግ።

የመከላከያ ዘዴዎች

- ፊትን አዘውትሮ በውሃና በሳምና መ□□-ብ
- የግልና የአካባቢን ንፅህና መጠበቅ
- የደረቅና የፍሳሽ ቆሻሻን በአግባቡ ማስወገድ

**ሐ) ማጅራት ገትር (Meningitis)**

የማጅራት ገትር በሽታ በወረርሽኝ መልክ ሲከሰት መንስኤው በከፍተኛ ደረጃ ተላላፊ የሆነው ሜኒንጎካል ሜኒንጂቲዲስ የሚባል የባክቴሪያ ዝሪያ ስለሆነ የወረርሽኝ ምልክት ሲታይ በአስቸኳይ ወደሚቀጥለው የጤና ድርጅት መላክ፤ መከታተልና ውጤቱንም ማወቅ ጸስ□ል□ል። አዘውትሮ የሚከሰተው የማጅራት ገትር በሽታ መንስኤው በሌሎች የባክቴሪያ ዝርያዎች /ሔሞፊሊሥ፤ እና ሥትሪኝ ቶኮክስ/ ሲሆን በሽታውን ቶሎ አውቆ ተገቢውን ህክምና

ወደሚያገኝበት የጤና ድርጅት በአስቸኳይ በመላክ የበሽተኛውን ህይወት ለማትረፍና ተያይዞ የሚመጣውን የአካል ጉዳት ለመከላከል ፀ  በም ረል።

- ህ በሽታ ሲይዝ የሚታዩ ምልክቶች
  - ትኩሣት
  - ራስ ምታት
  - ማሥ
  - መ
  - በህፃናት ላይ የርብቢት ማበጥ
  - ማንቀጥቀጥ
  - ምብ እምቢ ማለት
  - ማጅራት መገተር
  - አይን መፍጠጥ ናቸው።

**መ) እከክ /ስኬቢስ/**

**ትርጉምና መንስኤ**

እከክ በንጽህና ጉድለት የሚተላለፍ የቆዳ በሽታ ነው።

**ሚታዩ ምልክቶች**

እከክ በከፍተኛ ረጽ ሚተላለፍ ቆ  በሽታ ስለሆነ ብዙውን ጊዜ ከአንድ በላይ የቤተሰብ አባል በበሽ  ቃል። ህ በሽታ በእጅ ጣቶች መካከል፣ በመዳፍ፣ በክንድ እና እንዲሁም በሌላው የሰውነት ክፍል ሁሉ ከፊትና ከራስ በስተቀር ሚጸላ ሽታ ይኖረዋል።

ስለ መተላለፊያ መንገዱ፣ ስለሚስ የህክምና ርምጽ እንዲሁም መከላከያ ዘዴዎች የበለጠ ማብራሪያ የግል ጤና አጠባበቅ ፓኬጅን ይመልከቱ



#### 4. የቤተሰብና የሕብረተሰብን ጤና ነክ ባህሪያት ማሻሻል

የተቀናጀ የሕፃናት በሽታዎች ቁጥጥር ስልት በከፍተኛ ረጽ ሚገኘውን የሕፃናት ሞትና ህመም ለመቀነስ አንዱና ዋነኛ ዘዴ ሆኖ በአገራችን ሥራ ላይ እንዲውል እ.ኤ.አ. በ1996 ዓ.ም ተወስኗል። በዓለም አቀፍ ደረጃ የተቀናጀ የሕፃናት በሽታዎች ቁጥጥር ሶስተኛ ል ተጸመረ በቅርብ  ሲሆን የተጀመረበትም ዋና ምክንያት በጤና ተቋሙ የሚሰጠውን የሕክምና ጥራት ማሳደግ ብቻውን የሕፃናትን ሞትና ስቃይ ለመቀነስ ውስን የሆነ ድርሻ ያለው በመሆኑ ነው። ስለዚህ ቤተሰብንና ሕብረተሰብን ቁልፍ የሆኑ ጤና ነክ ባህሪያትን በንቃት እንዲያራምዱ እና ተግባራዊ እንዲያደረጉ ከፍተኛ ጥረት ማድረግና ብሎም፤

- ሕፃናትን በዋናነት የሚገድሉ በሽታዎች መከላከል
- ለታመመ ልጅ የሚሰጠውን የሕክምና አገልግሎት በቤተሰብና በህብረተሰቡ ደረጃ ከፍ ለማድረግ እና
- የቤተሰብና ሕብረተሰብ የጤና አገልግሎት በወቅቱ መጠጠር ባህል እንዲዳብር ለማድረግ የሚረዳ ዘርፍ ነው።

በመሆኑም ሃያ ቁልፍ የሆኑ ጤና ነክ የቤተሰብ ባህሪያት የሕፃናትን ሞት ለመቀነስ እና ሕፃናት የተስተካከለ የአእምሮና የአካል ዕድገት እንዲኖራቸው ከፍተኛ ሚና ስለአላቸው በቤተሰብና በማሕበረሰቡ ረጽ ተግባራዊ እንዲሆኑ ማድረግ ጸስልል። ይህንን ዘርፍ ሥራ ላይ በምናውልበት ጊዜ የሕፃናትና እንዲሁም የሕብረተሰቡን ጤና ለመጠበቅ እና ለመንከባከብ ጥረት ከሚያደርጉ ወይም ከሚመለከታቸው የመንግስትና የግል ድርጅቶች ጋር እንዲሁም መንግሥታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር ተባብሮና ተቀናጅቶ መሥራት የተሻለ ውጤት ለማምጣት በከፍተኛ ረጽ ረገጥ። ስለህ በሕብረተሰቡ ውስጥ ገብተው ከሚሰሩ የልማትና የጤና ድርጅቶችና ሠራተኞች ጋር በመተባበርና በተዘረጋው መሻቅር ም ኘሮጀክት ጋር በመቀናጀት መሥራት ከፍተኛ ቀሜታ አለው።

እንዲህ አይነቱ አሠራር ያለውን ግብአት በአግባቡና በቁጠባ ለመጠቀምና ለመረዳዳት የሚረዳ ስለሆነ መከተል ያለብን መርህ ነው። በሕብረተሰቡ ውስጥ ሚሰሩ ስራዎችም ሀብረተሰቡ ቅድሚያ የሚሰጣቸውና እነዚህ ጉዳዮች የእኔ አንገብጋቢ ችግሮቼ ናቸው ብሎ ለተግባራዊነታቸው የሚንቀሳቀስባቸው መሆን ይኖርባቸዋል። ከዚህ በተጨማሪ የዚህ የቤተሰብና የሕብረተሰብ ዘርፍ ዋነኛ ገለጫ ጽልማዳዊ ድርጊቶች የሆኑትን ማስቀረት እና ጠቃሚ የሆኑትን ደግሞ ማጠናከርና መደገፍ ብሎም ማራመድ ሲሆን ሚሰሩ ስራዎች በተጸመሩና ተሰሩ ካሉት ኘሮግራሞች ጋር ተቀናጅተውና የተጀመረውን አጠናክረው መሄድ አለባቸው። እነዚህ 20 ቁልፍ የቤተሰብና የሕብረተሰብ ባህርያት በአራት ዋና ዋና ክፍሎች ይከፈላሉ።  
እነሱም፡-

**3.1 የአካልና የአእምሮ እድገት**

1. ሕፃናት እንደተወለዱ ከእናታቸው ጋር ገላ ለገላ እንዲገናኙ ማድረግና በተወለዱ በአንድ ሰዓት ስዓት እንገርን ጨምሮ ጡት መጥባት እንዲጀምሩ ማግለጫ፤
2. የጡት ወተት ብቻ እስከ 6ወር ድረስ መስጠትና ቢያንስ እስከ ሁለት ዓመት መቀጠል፤
3. ተጨማሪ ምግብን ከ6 ወር ጸምሮ መስጠትና የጡት ወተትን ቢያንስ እስከ ሁለት ዓመት ሜ መቀጠል፤
4. ሕፃናት በቂ የሆነ እንደ ቫይታሚን ኤ፣ዲ፣ አዮዲን፣ ብረት ያሉ ንጥረ ነገሮችን ከምግባቸው ጋር ወይም በተጨማሪነት እንዲያገኙና በቂ የሆነ የፀሐይ ብርሃን ማግኘታቸውን ማረጋገጥ፤
5. ለልጆች ፍላጎት በቂ ትኩረት በመስጠትና አካባቢውን ምቹ በማድረግ አእምሯዊና ማህበራዊ እድገታቸውን ማጎልበት፤

### 3.2 በሽታን መከላከል

6. አይነ ምድር /የሕፃናትን ጨምሮ/ ከተጸዳዱ በኋላ፣ በአግባቡ ማስወገድ ምግብ ከማዘጋጀትና ልጆችን ከመመገብ በፊት እጅን በሳሙና መ□□ብ፣
7. ልጆች በየቀኑ ፊታቸውን እንዲታጠቡ ማድረግ፣
8. ወባማ በሆኑ አካባቢዎች የሚኖሩ ልጆች ሁልጊዜ በአልጋ አጎበር ውስጥ እንዲተኙ ማድረግና የወባ ትንኝ መራቢያ መንገዶች ማስወገድ፣
9. በልጆች ላይ የሚደረግን እንግልትና ኢሰብአዊ ድርጊት በጊዜ ማወቅ፣ መከላከልና አስፈላጊውን □ርምጽ መ□ሰ□፣
10. ህብረተሰቡ ኤድስን ለመከላከል፣ በኤች አይቪ ኢንፎክሽን ህፃናት እንዳይያዙ ለማድረግና ለታመሙና ወላጆቻቸውን ላጡ ልጆች አስፈላጊውን እንክብካቤና ድጋፍ ለመስጠት □ገሀሪ ለ□ግ እንዲያመጣ ማድረግ፣
11. ንፁህ የመጠጥ ውሃን መጠቀም

### 3.3 በቤት ውስጥ የሚሰጥ እንክብካቤ

12. ልጆች በሚታመሙበት ወቅት አግባብ ያለው ምግብ መስጠትና በርከት ያለ ፈሳሽ የጡት ወተትን ጨምሮ መስጠት፣
13. ልጆች በታመሙ ጊዜ በቤት ውስጥ አግባብ ያለውን ሕክምና መስጠት፣
14. ልጆችን ከማንኛውም አደጋ በሚገባ መጠበቅና ጉዳት ሲደርስባቸው በወቅቱ ተገቢውን ህክምና እንዲያገኙ ማ□ረ□፣
15. ጎጂ የሆኑ ልማዳዊ ድርጊቶችን ማስ□□□ /እንጥል ማስቆረጥ፣ ግግ ማስቧጠጥ፣ የሴት ልጅ ግርዛት፣ ሌሎች/

### 3.4 የጤና ክብካቤ ፍለጋና የሚሰጠውን ምክርና ህክምና ተግባራዊ ማድረግ

16. ለክትባትና ለእድገት ክትትል ልጆችን በጊዜው ወደ ጤና ድርጅት መውሰድ

17. ታመሙ ልጆች ተጨማሪ ሕክምና በሚያስፈልጋቸው ወቅት ወላጆች ፈጥኖ መረዳትና ተገቢውን ህክምና ከሰለጠነ የጤና ባለሙያ እንዲያገኙ ማረጋገጥ፤
18. የጤና ባለሙያ ምክር፣ ህክምናና፣ የክትትል ቀጠሮን ማክበር፤
19. ነፍስ ጡር ሴቶች ሁሉ የቅድመ ወለድ ምርመራ፣ የኤች አይቪ ምርመራና ምክር እንዲሁም በቂ የማዋለድ አገልግሎት ማግኘት ታቸውን ማረጋገጥ፤
20. ወንዶችም ሴቶችም የስነተዋልዶ ጤና አገልግሎት እንዲሹ ማበረታታት፡፡

## 5. ቁልፍ የቤተሰብ ባህሪዎችን ለማራመድ የሚረዱ ዋና ዋና መልዕክቶች

- ጸናት ጡት ወተትን ብቻ እስከ 6 ወር ድረስ ማጥባትን በተመለከተ፡-ጸለቅ ዓቅም ቀጭ ብሎ እንደተገለጸው በሚገባ ማስረዳት
- አንድ ሕፃን ከስድስት ወር በኋላ ተፊ ማሪ ምብብ መጀመር አስፈላጊ ሲሆን የጸናት ጡት ወተት ግን ሁለት ዓመት ወይም ከዚያ በላይ እስኪሆነው ድረስ መቀጠል አለበት፡፡
- ዓይነምድርን በአግባቡ ማስወገድ /የህፃንን ዓይነምድር ፊ ምር/ እና ከተፀዳዱ በኋላ ምግብ ከማዘጋጀት በፊት እና ልጆችን ከመገቡ በኋላ እጅን በሳሙና መጠጠጥ፡፡
- ሕፃናት በኘርማራሙ መሰረት የሚሰጠውን ክትባት በሙሉ አንድ ዓመት ሳይሞላቸው ጨርሰው እንዲከተቡ ማድረግ ወይም ክትባት ወደሚሰጥበት ቦታ መጠጠጥ፡፡
- በወባማ አካባቢ ሕፃናት በመድሐኒት በተነከረ የአልጋ አኅበር ውስጥ እንዲተኙ በማድረግ ወባን መከላከል፡፡
- ሕፃናት በሚታመሙበት ጊዜ ምግባቸውንና ከወትሮው የበለጠ ፈሳሽ፣ የጡት ወተትን ጭምር መስጠት መቀጠል ያስፈልጋል፡፡

- ህፃናት የህመም ምልክት ሲያሳዩ ቶሎ ተገንዝቦ የሰለጠነ የጤና ባለሙያ ወዳለበት ቦታ መግባት ጸስጥጥ
- የሰለጠነ የጤና ባለሙያ የሚያዛቸውን መድሃኒቶች በአግባቡ ለታመሙ ልጆች መስጠትና የሚሰጠውን ምክር በደንብ ተረድቶ በተግባር ማዋል የሕፃናትን በሽታ ለመፈወስና ሞት ለመቀነስ አይነተኛ መንገድ ነው።

## 6. በሕፃናት ላይ የሚፈጸሙ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች

### 6.1 እንጥል ማስቆረጥ እና ጉሮሮ ማስባጠጥ

ብዙ ወላጆች ልጆቻቸው ትኩሳት በሚይዛቸው ጊዜ ምግብ አልበላ ሲሉ እንጥል ወርዳቸዋል ብለው ይገምታሉ። ሕፃናት በማንኛውም በሽታ ሲያዙ ትኩሳት ይኖራቸዋል። የምግብ ፍላጎታቸውም ይቀንሳል። ትኩሳትና የምግብ ፍላጎት መቀነስ ለብዙ ሕመሞች ምልክቶች ናቸው። የተወሰነ የሕመም ምልክት አይደለም። እንጥሉ ወርዳል ብለው በሚአስቡበትም ጊዜ እንጥሉ ፈንድቶ ሕፃኑን ከሞት ያደርሰዋል የሚል ፍራቻም አለ። ይህ ትክክለኛ ግምት አይደለም። እንዲያውም እንጥሉ በሚቆረጥበት ጊዜ ብዙ ደም ፈሶት የሕፃኑ ሕይወት ሊያልፍ ይችላል። ከዚህም ሌላ እንጥል የሚቆርጡበት መሣሪያ ንጹሕናው የተጠበቀ ካልሆነ በቁስሉ አማካኝነት ረቂቅ የሆኑ ተሕዋሶችን በደም ሥሩ ወደ ሰውነቱ ገብተው የኤች.አይ.ቪ. እና የሌሎችም በሽታዎች ስለባ ሊሆን ይችላል። በዚህም ምክንያት ለሕመምና ለሞት ይዳረጋል። የጉሮሮ ሕመም የሚባለው ከግራና ከቀኝ የሚገኙት እጢዎች /ቶንስሎች/ በሚያብጡበትና መግል ይዘው በሚታዩበት ጊዜ ነው። በዚህ ጊዜ ወደ አቅራቢያው የጤና ድርጅት በመውሰድ ሕክምና እንዲያገኝ ማድረግ እንጂ ጉሮሮ ማስባጠጥ ተገቢ አይደለም።

## 6.2 □□ ማስወጣት

ሕፃናት ተቅማጥና ትውከት በሚይዛቸው ጊዜ የሚሰጠው ምክንያት ግን ስላልተነቀለ ነው ይባላል። ይህ ካለማወቅ የሚሰጥ ምክንያት ነው። ተቅማጥና ትውከት ሊመጣ የሚችለው አብዛኛውን ጊዜ ከንጽሕና ጉድለት ነው። ግን ነው በማለት የሚነቀለው በሙብቀል ላይ ያለው የሕፃኑ ጥርስ ስለሆነ ከዚህ አጉልና የማይገባ ተግባር ከመፈጸም መገታት ያስፈልጋል። ሕፃኑ ተቅማጥና ትውከት ሲይዘው በአቅራቢያው ወደሚገኘው የጤና ድርጅት መውሰድ ያስፈልጋል።

## 6.3 የሴት ልጅ ግርዛት

የሰውነታችን የተሰያዩ አካሎች የተፈጠሩልን የራሳቸው አገልግሎትና ጠቀሜታ ስላላቸው ነው ። በዚህ መሠረት ለሴት ልጅ ተረካቦ ስጋም ሆነ መውለድ የራሱ ድርሻ ያለውን የብልት አካል ማስገረዝ አስፈላጊ አይደለም። ይህ ጎጅ ድርጊት ሃይማኖታዊም ሆነ ባህላዊ ድጋፍና መሠረት የለውም። ብዙ ደም ፈሶአቸው ከፍ ያለ ችግር ላይ ይጥላቸዋል። ቁስሉ ሲድን የሚያስከትለው ጠባሳ በመውለድ ጊዜ ደግሞ ከባድ ችግር ሊያስከትል ይችላል፤ ከዚህም በተጨማሪ ሴት ልጆችን ለከፍተኛ የስነ-ልቦናና አካላዊ ችግር ይዳርጋቸዋል። በመሆኑም ድርጊቱን ለማስወገድ ትምህርት በሰፊው መስጠት ያስፈልጋል።

## 6.4 ጣጣቴ ማስተኮስ

አንድ ሕፃን በታመመ ጊዜ ጣጣቴ ማስተኮስ ምንም መፍትሔ አይሰጥም። ይልቁንም በተጨማሪ በእሳት አቃጥሎ ከስቃይ ላይ ሌላ ስቃይ መጨመር ይሆናል። ይህ ድርጊት ሊ□□ እንደሚገባ ማስተማር።

## 6.5 የህፃናትን የዓይን ቅንድብ ማሰንጠቅ

ሕፃናት አይናቸውን ሲታመሙ ቅንድብ ማሰንጠቅ ለበሽታው መፍትሄ አይደለም። ይልቁንም ንፅህናው ባልተጠበቀ መሣሪያ አማካኝነት ለኤች.አይ.ቪ፣ ለመንጋጋ ቁልፍና ለሌሎች ተላላፊ በሽታዎች ያጋልጣቸዋል።

**6.6 ህፃናትን የፀሐይ ብርሃን እንዲያገኙ ማግለጫ**

ሕፃናትን የፀሐይ ብርሃን እንዲያገኙ ማድረግ የህፃናትን እግሮችና የደረት አጥንት በማጣመም ለከፍተኛ የጤና ችግር ያጋልጣቸዋል። ህፃናት በተወለዱ አንድ ሳምንት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ጠዋት ጠዋት ሙሉ ገላቸው የፀሐይ ብርሃን እንዲያገኙ ማስጀመር ጠቃሚ ነው።

**6.7 በህል መኃኒቶች**

በሀገራችን ብዙ በህል መኃኒቶች ይገኛሉ። እነዚህ መኃኒቶች ምንነታቸው በጥናት ተረጋግጦ አልታወቀም። ስለዚህ ፍቱንነታቸውና መጠናቸው ያልታወቀ መኃኒቶች ለሕፃናት መስጠት እስከ ዘለቄታው በህይወታቸው፣ በአካላዊና አዕምሮአዊ ዕድገታቸው ላይ አደጋ ሊያስከትል ይችላል።

**6.8 ቅቤ ማሻጣ**

አዲስ ለተወለዱ ጨቅላዎች ቅቤ ማዋጥ ሆድን ያለሰልሳል የሚል የተሳሳተ አመለካከት በመኖሩ ትንሽ የማይባሉ የህብረተ ሰብ ክፍሎች ተግባራዊ ሲያደርጉ ይሰተዋላል። ይህ ከእውነት የራቀ አስተሳሰብ ነው። ቅቤው ለሕፃኑ አንጀት በጣም ስለሚከብደው ተቅማጥና ትውከት ያስከትላል። ከዚህ በተረፈም ንጽሕናው ያልተጠበቀ ስለሚሆን ሌላ በሽታ ሊያስከትል ይችላል። ቅቤው ወደመተንፈሻ አካሉ ከገባ ሕፃኑ ትንታ ወይም መታፈን በቀላሉ ሊገጥመው ስለሚችል ይህንን ድርጊት አለማከናወን ይገባል።

ከላይ የተገለፁትን ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች አደገኛነታቸውን ለእናቶችና ለቤተሰብ በማሥተማር ተረድተው ከእነዚህ ድርጊቶች እንዲቆጠቡ ማድረግ። አለበለዚያ ልጆቻቸው ገና በህፃንነት ዕድሜያቸው አካለ ጎዶሎ በሽተኛ አልፎም ለሞት እንደሚዳርጋቸው በአንክሮ ማስረዳት ያስፈልጋል።

## 7. በሕጻናት ላይ ሊደርሱ የሚችሉ አደጋዎች

- ሕፃናት ከሚጫወቱበት ክፍል /አካባቢ/ እሳት አለማስቀመጥ። እሳት ያለበት ክፍል ሕፃናትን እንዳይገቡ መዝጋትና ምድጃውን ከፍተኛ ቦታ ላይ መሥራት፤
- የመኪና መንገድ ሲያቋርጡ ግራና ቀኝ አይተው እንዲሻገሩ ማስተማር በየመንገዱ ኳስ እንዳይጫወቱ መንገር፤
- ማንኛውም ዓይነት መድኃኒት፣ ጋዝ፣ ቤነዚን፣ አልኮል፣ ካቲካላ የመሳሰሉትን ህፃናት በማይደርሱበት ቦታ ማኖር፤
- ሕፃናትን ከፍተኛ ሥፍራ ላይ /ጠረጴዛ መደብ/ ላይ አለመተው፤ አለበለዚያ በድንገት ወድቀው የስብራት አደጋ ሊደርስባቸው ይችላል፤
- ከፍ ያለ ሕፃን ከሆነ ካሁን በፊት ያላየውን መጫወቻ ሲያገኝ ለቤተሰቡ አምጥቶ እንዲያሳይ ማስተማር፤ እንዳይቀጠቅጥ መንገር እንደ ቦንብ ፍንዳታ ከመሳሰሉት አደጋ ሊያድነው ይችላል፤
- ሕፃናት ሹልነት ባለው /ስለት ባለው/ መሣሪያ እንዳይጫወቱ ማስተማር፤ ለምሳሌ ወስፌ፣ ቢላዋ፣ መርፌ፣ ምላጭ አርቆ ማስቀመጥ ይገባል።

ከላይ የተዘረዘሩትን ጥንቃቄ ማድረግ ጠቃሚ ነው። ድንገተኛ አደጋ ቢደርስ ግን ቶሎ እርዳታ ወደ ሚገኝበት ቦታ መውሰድ ጸስ□ል□ል።



## 8. የሚጠበቁ ውጤቶች

- በሕብረተሰቡ በስፋት በልተው የሚታዩት የጤና ችግሮች ላይ ያተኮረ የጤና አጠባበቅ ትምህርት በተለያዩ ዘዴዎች በመስጠት ሕብረተሰቡ የባህሪ ለውጥ እንዲያመጣ በረታታ ይቻላል።
- ሕብረተሰቡ ለእናቶችና ህፃናት የሚሰጡትን የጤና አጠባበቅ አገልግሎቶች በሚገባ ያውቃል። የአገልግሎቶችም ተጠቃሚ ይሆናል።
- የቅድመ ወሊድ አገልግሎት ተጠቃሚ ነፍሰ-ር እናቶች ቁፃር ይፈጠራል።
- በሰለጠኑ የልምድ አዋላጆችና በአቅራቢያው በሚገኙ የጤና ድርጅቶች የወሊድ አገልግሎት ተጠቃሚ የሚሆኑ እናቶች ቁጥር ይጨምራል።
- የድህረ ወሊድ የጤና አጠባበቅ ሽፋን ከፍ ይላል።
- እናቶችና ሕፃናት የቅድመ ወሊድ፣ የወሊድ፣ የድህረ ወሊድና የሕፃናት ጤና አጠባበቅ አገልግሎት ተጠቃሚ በማድረግ በከፍተኛ ረገድ ላይ የሚገኘውን የእናቶችና ሕፃናት ሕመምና ሞት ቁጥር ይቀንሳል።
- እናቶች የስነተዋልዶ ጤና አገልግሎት ተጠቃሚ ይሆናሉ።
- እናቶችንና ሕፃናትን በወቅቱ ክትባታቸውን እንዲያገኙ በማድረግ የክትባት ሽፋን ከፍ ይላል። ብሎም በክትባት ልንከላከላቸው በምንችላቸው በሽታዎች ምክንያት የሚደርሰው የህፃናት ሕመም፣ ሞትና አካለ-ተጎድነት ይቀንሳል።
- ለእናቶች የመንጋጋ ቆልፍ ክትባት እንዲያገኙ በማረጋገጥ በመንጋጋ ቆልፍ ምክንያት የሚሞቱት አራስ ህፃናት ቁጥር ይቀንሳል።
- ሕብረተሰቡን የባህሪ ለውጥ እንዲያመጣ በማስተማር በእናቶችና በህፃናት ላይ የሚፈጸሙ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ይቀንሳሉ።
- ሕብረተሰቡን በህፃናት ላይ ሊደርሱ ስለሚችሉ አደጋዎችና ቅድመ ጥንቃቄያቸው በማስተማር በህፃናት ላይ ሊደርሱ የሚችሉ አደጋዎች ይቀንሳሉ።

## 9. ግምገማና ክትትል

- ❖ የቀበሌው ነዋሪ የሆነውን ህዝብ ብዛት፣ ምግብ፣ ክፍያ፣ ሥራ መግቢያ መጠን፣
- ❖ በቀበሌው ስር ስራ ማረጋገጥ ትምህርት ቤቶች፣ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ የገበሬ የወጣትና የሌሎች ማህበራት መዝገብ መያዝ፣
- ❖ ለህብረተሰቡ በተለያዩ ህብረተሰብ አቀፍ ማህበራዊ ተቋማት የተሰራጨ የትምህርት መርጃ ፅሁፎችን ብዛት መመዘገብ፣
- ❖ በቡድን ወይም በህዝብ መሰብሰቢያ ቦታ መረጃና ትምህርት የተሰጠው ህዝብ ብዛት መመዘገብ፣
- ❖ አዲስ የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት ተጠቃሚ መሆን፣
- ❖ ከጤና ኤክስቴንሽን ሠራተኞች ደረጃ በላይ የሆኑትን የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት እንዲያገኙ ወደ ሌሎች የህክምና ድርጅቶች የተላኩናተጠቃሚ የሆኑ ቤተሰቦች ብዛት ትመዘግባሉ፣
- ❖ በየዕለቱ ያከናወኑትን ሥራዎች ያጠቃልላሉ፣ ፓኬጅ ጸስቻውን ጠቀሜትና የተገኘውን ውጤት የሚገልፅና በአፈፃፀም ወቅት ያጋጠሙ ችግሮች ያካተተ ወርሃዊ፣ ጅምር ማመትና የዓመት ሪፖርት ለወረዳ ጤና ጥበቃ ጽ/ቤት ትልካላች።

### በወረዳ ጤና ጥበቃ ጽ/ቤት የሚከናወኑ

- ❖ ኘሮግራሙ በተፈለገው አቅጣጫ መሄዱን ለመከታተል፣ የጤና ኤክስቴንሽን ሠራተኞች በአፈፃፀም የገጠሟት ችግሮች ካሉ መፍትሔ ለመስጠትና እንዲሁም በቅርብ ተገኝቶ ሙያዊ ድጋፍ ለመስጠት በ3 ወር አንድ ጊዜ ወይም እንደአስፈላጊነቱ በቦታው በመገኘት ከቀበሌው ምክር ቤት ጋር ክትትል ያደርጋል።

በህመም እና በጤንነት ጊዜ የሚሰጥ የአመጋገብ ምክር (ድጋፍ)



- ሕጻኑ ጡት መጥባት በፈለገ ጊዜ ሁሉ ቀንና ሌሊት ከ10-12 ሰዓት ያጥቡት
- ሕጻኑ 6 ወር እስኪሞላው ድረስ ጡትን ብቻ ያጥቡ-ውሃም ቢሆን አይስጡ-ማጥባት የጀመሩትን አንደኛውን ጡት ወተቱ እስኪሟጠጥ ድረስ ያጥቡት ከዚያም ወደ ሌላ፣ ሰጠጥ፣ ሰህም ሕጻኑ ከበስተጋላ የሚመጣውን በምግብ የዳበረውን የጡት ወተት ለማግኘት ያስቸለጥል
- በህመም ጊዜ ከህመም በጋላ ቢያንስ እስከ 2 ሳምንት ድረስ ጡትን ቶሎ ቶሎ ያጥቡ
- ተፈ ማሪ ምግብ/ሰህም ውሃም ቢሆን አይስጡ
- በየቀኑ ከ20-30 ጊዜ ያህል ህጻኑን ጠቅሙ ያሙቁት



- ሕጻኑ መጥባት በፈለገ ጊዜ ሁሉ ቀንና ማታ ያጥቡት
- ተፈ ማሪ ምግብ በ6 ሰዓት ጊዜም
- ወዲያውኑ የተዘጋጀ የዳበረ ምግብ ይስጡት ከአህልና ከጥራጥራ ተቀላቅሎ የተዘጋጀ ገንፎ፣ የሽሮ ፍትፍት፣ የመረቅ ፍትፍት፣ የተፈጨ ድንችና ካሮት፣ የተፈጨ ጎመን፣ እንቁላል፣ እና ፍራፍሬን በመጨመር ምግቡን አዳብሩት
- በሕጻኑ ምግብ ውስጥ ቅቤ ወይም ዘይት ሁልጊዜ ግራ ምሩ ከእንስሳት ውጤቶች (ሥጋ፣ ጉብት፣ ግሣ፣ እንቁላል) ቢጫ ፍራፍሬ (ብርቱካን፣ ፓፓይ፣ ማንጎ) ይመግቡት
- ህጻኑ ጡት የሚጠባ ከሆነ ከላይ የተዘረዘረውን ምግብ በቀን ውስጥ 3 ጊዜ፣ ጡት የማይጠባ ከሆነ በቀን ውስጥ 5 ጊዜ ይመግቡት (3 ጊዜ ዋና ምግብ 2 ጊዜ መጠጠን)
- በስድስት ወር ጡት መጥባት ያቆመ ሕጻን ከሚወስደው ተጨማሪ ምግብ በላይ በቂ የጡት ምትክ ወተት ማግኘት አለበት
- በህመም ወቅት የጡት ወተትን ምግብና ፈሳሽን ቶሎ ቶሎ መግቡት እንዲሁም ከተሻለው በጋላ ለ 2 ሳምንት ያህል አንድ ተጨማሪ ምግብ መስጠት ከህመሙ በቶሎ እንዲያገግም ይረዳዋል።
- ለልፀ ከ6 ወር ጀምሮ በዓመት ሁለት ጊዜ ቫግታሚን ኤ እንዲወስድ ያድርጉ
- ልፀን ፀሐይ ያሙቁት



- ልፀ ጡት መጥባት በፈለገ ጊዜ ሁሉ ያጥቡት
- በተሰቡ ከሚመገቡት በንጥረ ምግብ ከዳበረ በቂ ምግብ ይመግቡት ከተለያዩ እህልና ጥራጥራ የተዘጋጀ ገንፎ፣ ሽሮ፣ ክክ፣ መረቅ ፍትፍት፣ የተፈጨ ድንችና ካሮት፣ ጎመን ያልተበረዘ ወተት እንቁላልና ፍራፍሬ ይመግቡት
- ትንሽ ቅቤ/ዘይት በልጅ ምግብ ጠቅሎ ግራ ምሩ ከእንስሳት ውጤቶች (ሥጋ፣ ጉብት፣ ግሣ፣ እንቁላል) ጥራጥራ እና አትክልቶች (አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል ካሮት) ቢጫ መልክ ያላቸው ፍራፍሬች (ብርቱካን፣ ፓፓይ፣ ማንጎ) ይስጡት
- ይህን ምግብ ቢያንስ በቀን 5 ጊዜ ከ3-4 ዋና ምግብና 2 ጊዜ መጠጠን ይስጡት
- ጡት መጥባት ያቆመ ልጅ የጡት ወተት ምትክ በተጨማሪ ከሚወስደው ምግብ ላይ ማግኘት አለበት
- ለልፀ የራሱን ምግብ እያጫወቱ ይመግቡት
- ወዲያውኑ የተዘጋጀ ምግብ በንጹህ ጊዜ ይስጡት
- በህመም ወቅት የፈሳሽን/ የምግብ መጠን ግራ ምሩ ቀድሞ ከሚወስደው በተጨማሪ አንድ በየቀኑ ለሁለት ሳምንት ያህል ይመግቡት ይህ በፍጥነት እንዲያገግም ማጠቃለያ ::
- ለልፀ ቫግታሚን ኤና ሜቤንዳዞል (mebendazole) በየስድስት ወሩ እንዲያገኝ ጸጠር



- በተሰቡ ከሚመገቡት ከተለያዩ የምግብ ገጭቶች ወዲያውኑ የተሰራ ምግብ በቀን ከ 3-4 ጊዜ ይመግቡት
- በተፈ ማሪ እንደ እንቁላል፣ ወተት፣ ግራግራ ቁ፣ ሰህም፣ ጠጠጥ፣ ግራግራ የመሰላሉትን በቀን ሁለት ጊዜ ለመክሰስ ይስጡት
- ለልፀ የራሱን ምግብ ጠቅሎ ይመግቡት
- ወዲያውኑ የተሰራ ምግብ በንጹህ ሰቃ ይስጡት
- በህመም ወቅት የፈሳሽና የምግብ መጠን ግራ ምሩ ቀድሞ ከሚወስደው በተጨማሪ አንድ በየቀኑ ለሁለት ሳምንት ያህል ይመግቡት ይህ በፍጥነት እንዲያገግም ማጠቃለያ ::
- ለልፀ ቫግታሚን ኤና ሜቤንዳዞል (mebendazole) በየስድስት ወሩ እንዲያገኝ ጸጠር
- 

**የቆየ ተቅማጥ ለያዛቸው ህጻናት የአመጋገብ ምክር**

**ህጻኑ የሚጠባ ከሆነ ቀንም ሆነ ማግኘት ቶሎ ቶሎ መስጠት ሌላ ወተት የሚወስድ ከሆነ**

- በጡት ወተት ይተኩት
- በእርጋ ወይንም በሌሎች የወተት ውጤቶች ይተኩት
- ግማሹን ወተት ላላ ብለው በተሰሩ እና በንጥረ ነገር በዳበሩ ምግቦች ይተኩ

**ለሌሎች ምግቦች የአመጋገብ ምክርን ለህጻኑ ማግኘት እድሜ መሰረት ይከተሉ**

